

「6歳から64歳までのハイリスク者に対する肺炎球菌ワクチン接種の考え方」

第3版

(2025年4月9日)

＜目次＞

Executive Summary

はじめに

1. 小児および成人の肺炎球菌の血清型分布の動向について
2. 小児および成人におけるハイリスク者について
3. 慢性心疾患
4. 慢性肺疾患
5. 慢性腎臓病
6. 慢性肝疾患
7. 糖尿病
8. 自己免疫性疾患
9. 悪性腫瘍・臓器移植後
10. 免疫不全（主に小児）

おわりに

本稿で使用した略語

PPSV23: 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine (23価肺炎球菌莢膜多糖体ワクチン)

PCV13: 13-valent pneumococcal conjugate vaccine (13価結合型肺炎球菌ワクチン)

PCV15: 15-valent pneumococcal conjugate vaccine (15価結合型肺炎球菌ワクチン)

PCV20: 20-valent pneumococcal conjugate vaccine (20価結合型肺炎球菌ワクチン)

IPD: invasive pneumococcal disease (侵襲性肺炎球菌感染症)

OPA: opsonophagocytic activity (オプソニン活性)

RCT: randomized controlled trial (ランダム化比較試験)

ACIP: Advisory Committee on Immunization Practices

RR: relative risk (相対リスク)

OR: odds ratio (オッズ比)

HR: hazard ratio (ハザード比)

CI: confidence interval (信頼区間)

IRR: incident rate ratio (罹患率比)

Executive Summary

- ・ わが国では 23 価肺炎球菌莢膜多糖体ワクチン (PPSV23)、15 価結合型肺炎球菌ワクチン (PCV15) に次いで、2024 年 8 月に 20 価結合型肺炎球菌ワクチン (PCV20) が高齢者と 64 歳未満のハイリスク者に対して薬事承認された。
- ・ 2023 年の成人侵襲性肺炎球菌感染症 (IPD) 原因菌の血清型分布は、PCV15 血清型が 30%、PCV20 血清型と PPSV23 血清型がいずれも 45% であった。
- ・ わが国の感染症発生動向調査における IPD の報告数は 5 歳未満と 65 歳以上に多いが、5~64 歳の年齢層も全体の 25.0% を占めており、IPD 患者のうち基礎疾患有する者の割合は 6~14 歳で 42.7%、15~64 歳では 57.7% であった。
- ・ IPD 患者の主な基礎疾患は、6~14 歳では血液・腫瘍性疾患、神経疾患、髄液漏・人工内耳、先天性免疫不全症候群、染色体異常、15~64 歳では糖尿病、自己免疫性疾患、ステロイド薬投与、慢性肝疾患、治療中の固形癌、免疫抑制薬投与、脾摘後、先天性無脾／脾低形成、造血幹細胞移植後、慢性腎臓病、慢性心疾患等であった。
- ・ 50~64 歳における肺炎を含む肺炎球菌感染症の罹患率は、19~49 歳よりも約 5 倍高く、基礎疾患は慢性肺疾患、慢性肝疾患、慢性心疾患、糖尿病、がんが多かった。
- ・ 6 歳から 64 歳においても肺炎球菌感染症のハイリスク者では肺炎球菌ワクチンによる予防が重要である。

基礎疾患ごとの病態の特徴、肺炎球菌感染症の発生リスク、ワクチンの免疫原性、予防効果、接種推奨の要点を次ページの表 1 にまとめた。

表1 基礎疾患ごとの肺炎球菌感染症のリスクとワクチンの効果

基礎疾患	病態の特徴	肺炎球菌感染症の発症頻度と予後	ワクチンの免疫原性	ワクチンの予防効果	接種推奨の要点
慢性心疾患	心拡大に伴う気管支の圧迫による換気障害、肺うっ血による気道分泌物の増量および喀痰の喀出困難のため肺炎リスクが高まる。	19歳以上の慢性心疾患患者でIPDのリスクは2.6~4.7倍、肺炎球菌性肺炎のリスクは7.1~15.7倍高い(日本)	慢性心疾患患者を含む18~49歳へのPCV13/15とPPSV23の連続接種でIgGとOPAが上昇する(海外)。心血管疾患患者を含む18~64歳でPCV20接種後OPAが増加する(海外)。	18歳以上の市中肺炎患者を対象としたコホート研究で、PPSV23接種群では急性冠症候群発生率がHR0.46と低下する(海外)。心血管疾患患者の全死亡率は、PCV13/PPSV23接種群で22%減少する(海外)。	PPSV23単回接種の推奨が適切だが、発症した場合の生命予後が不良な場合や合併疾患のため全身的な免疫能低下が予想される場合はPCV20単回接種またはPCV15とPPSV23の連続接種も選択肢である。
慢性肺疾患	気道クリアランスの低下に伴い、末梢気道の炎症による喀痰量増加や局所免疫の低下がみられる。ステロイド薬や免疫抑制薬等の使用によって全身的な免疫低下をきたしている場合も多い。	慢性肺疾患患者のIPD罹患率は19~49歳で6.5倍、50~64歳で12.9~21.4倍高く、肺炎球菌性肺炎の罹患率は19~49歳で5.6~8.2倍、50~64歳で6.8~12.8倍高い(日本)。	40歳以上のCOPD患者でPCV7とPPSV23の免疫原性が確認され、PCV7の方が高い傾向にある(海外)。18~49歳の慢性肺疾患患者のPCV13/PCV15とPPSV23の連続接種で各血清型のIgGとOPAが上昇する(海外)。	COPD患者を対象としたRCTで、PPSV23による65歳未満の市中肺炎予防効果は76%だった(海外)。インフルエンザ罹患COPD患者対象のデータベース研究で、PPSV23/PCV13連続接種が二次性細菌性肺炎を有意に減少させた(海外)。	重症例を含む慢性肺疾患患者に対してPPSV23接種を推奨する。5年間隔でのPPSV23再接種も可能。PCV20単回接種またはPCV15とPPSV23の連続接種も有用な選択肢である。
慢性腎臓病(CKD)	Bリンパ球減少、CD4陽性Tリンパ球減少、Tリンパ球の抗原刺激に対する反応性低下、好中球の機能低下がみられ感染症リスクが高い。血液透析ではさらに高まる。	ネフローゼ症候群、慢性腎不全や腎移植を含むCKD患者のIPDによる致命率は、基礎疾患のない場合に比べてOR6.2と高い(海外)。肺炎による入院後30日以内の死亡リスクはHR1.78と高く、原因菌は肺炎球菌が多い(国内)。	血液透析患者でPPSV23およびPCV13接種後にIgGとOPAが上昇する。PCV13の方が有意に高い血清型が多かったが、52週後にはいずれも低下した(海外)。免疫の持続期間は不明確。	血液透析患者においてPPSV23は全死亡を有意に減少させ(米国のHR0.94、日本のHR0.62)、心疾患死を有意に減少させた(米国のHR0.91、日本のHR0.36)。米国の症例対照研究で、PCV13はeGFR30~59の患者の肺炎球菌感染症による入院リスクを39%減少させた(海外)。	PCV20単回接種またはPCV15とPPSV23の連続接種を推奨する。

基礎疾患	病態の特徴	肺炎球菌感染症の発症頻度と予後	ワクチンの免疫原性	ワクチンの予防効果	接種推奨の要点
慢性肝疾患	肝臓は門脈を通じて微生物の曝露を受けるため高度な免疫能を備えた臓器であるが、慢性肝疾患、ことに肝硬変では網内系機能の低下、タンパク合成の低下など肝臓の機能低下に加え、免疫担当細胞全般にわたって免疫応答が障害され、菌血症・敗血症が起こりやすい。	慢性肝疾患患者のIPD罹患率は19~49歳で4.1倍、50~64歳で11.9倍、肺炎球菌性肺炎の罹患率は19~49歳で3.9倍、50~64歳で3.2倍だった（日本）。慢性肝疾患のIPD発症リスクは、基礎疾患のない症例に比べて15.4倍であった（海外）。	アルコール性肝硬変患者において14価莢膜多糖体ワクチン接種12週後に抗体が上昇（海外）。肝移植前にPCV13を接種し上昇した抗体価は移植6か月後にはベースラインまで低下するが、再接種で回復する（海外）。	慢性肝疾患患者を対象とした肺炎球菌ワクチンの予防効果は報告されていない。	慢性肝疾患、特に肝硬変患者はPCV20単回接種またはPCV15とPPSV23の連続接種を検討することが望ましい。肝移植患者は免疫抑制状態に分類されるため、PCV20単回接種またはPCV15とPPSV23による連続接種が推奨される。
糖尿病	高血糖に伴う好中球やマクロファージ機能の低下、血管内皮機能や凝固異常、神経障害、栄養障害が易感染性に関わっている。重症感染症では、炎症性サイトカイン等でインスリン抵抗性が増強し高血糖が増悪、重症化しやすい。	18歳以上の糖尿病患者におけるIPDの発症リスクは1.8~3.5倍高い（海外）。肺炎球菌性肺炎の発症リスクは、英国では60歳未満で2.03倍、米国では18~49歳で3.1倍、50~64歳で3.0倍高かった。	13人の高齢の糖尿病患者のPPSV23接種後に、検討したすべての血清型のIgGが上昇した（国内）。18~49歳の糖尿病患者において、PCV15接種1か月後にはすべての血清型のIgGとOPAが上昇した（海外）。	観察研究のメタ解析で、糖尿病患者でのPCV接種群は非接種群に比べ、臨床試験ではワクチン含有血清型による肺炎の発生率が、観察研究ではワクチン接種後1年間の全肺炎による入院率が有意に低かった（海外）。	ワクチンの効果に関する一定の見解が得られていないが、各ワクチンの免疫原性が確認されており、接種による肺炎発症抑制効果が期待される。PCV20単回接種またはPCV15とPPSV23による連続接種も選択肢と考えられる。
自己免疫性疾患	疾患自体の免疫異常に加えて、ステロイド薬、メトトレキサート(MTX)、生物学的製剤、JAK阻害薬などの免疫抑制薬を用いるため肺炎球菌感染症が起こりやすい。	IPDの発症率はSLEで13倍高かった（オランダ）。肺炎球菌性肺炎の罹患率比（IRR）は関節リウマチ（RA）で4.4、SLEで4.3と高かった（米国）。	PPSV23とPCV13の免疫原性は、少量から中等量のステロイド、TNF阻害剤、抗IL-6受容体抗体の影響は少なかったが、MTXやリツキシマブの使用によって減弱した（海外）。	MTX投与中のRA患者においては、PPSV23非接種群は接種群と比べて肺炎発症の相対リスクが9.7と高かった（海外）。RA患者の後ろ向きコホート研究で、ワクチン未接種者はオッズ比1.64~2.42でIPDが多かった（海外）。	免疫抑制薬投与中の65歳以下の自己免疫疾患患者に対してはPPSV23の接種が望ましい。PCV15とPPSV23の連続接種も選択肢である。免疫抑制薬を使用している患者にはPCV20の効果が期待される。

基礎疾患	病態の特徴	肺炎球菌感染症の発症頻度と予後	ワクチンの免疫原性	ワクチンの予防効果	接種推奨の要点
悪性腫瘍・臓器移植後	化学療法に伴う免疫不全、手術に伴う脾摘、血液腫瘍では疾患自体による液性免疫不全、移植に伴う免疫抑制薬の使用などの影響で肺炎球菌感染症に罹患しやすい。	非悪性腫瘍患者と比較したIPDのリスク比は、固体腫瘍患者で1.78、血液腫瘍患者で9.53と高い（海外）。19-49歳の若年悪性腫瘍患者における肺炎球菌感染症の罹患リスクはHR 8.32と高い（国内）。	血液腫瘍でも多発性骨髄腫や悪性リンパ腫ではPPSV23接種後の一定の抗体獲得が報告されているが、慢性リンパ性白血病では免疫原性が低く、PCVの方が優れていた。造血幹細胞移植後は著明に低下した。	19歳以上の血液腫瘍患者で治療開始前のPCV13接種が肺炎や敗血症による入院を有意に減少させた（OR 0.45）（海外）。造血幹細胞移植後患者で、PPSV23のみからPCV-PPSV23の連続接種に推奨を変更したところIPDが約1/10に減少した（海外）。	悪性腫瘍、固体臓器移植後患者にはPCV20単回接種またはPCV15とPPSV23による連続接種を推奨する。 造血幹細胞移植後3～6か月でPCV20またはPCV15を1～2か月間隔で3回、その後6か月以降もしくは移植後1年以降にPCV20/PCV15/PPSV23を接種する。 CAR-T治療後6か月以降に1～2か月間隔でPCV20を3回接種。 抗B細胞抗体治療後6～12か月以内の接種は推奨しない。
免疫不全（主に小児）	機能的・解剖学的無脾症、慢性髓液漏を伴う者、人工内耳装置用者、補体欠損症やIRAK-4欠損症など原発性免疫不全症、HIV感染、悪性疾患、循環器・呼吸器の慢性疾患、腎不全、肝機能障害、糖尿病、免疫抑制化学療法を受けている者、臓器移植・骨髄移植を受けたことのある者では肺炎球菌感染症が起こりやすい。	血液悪性疾患、HIV/AIDS、鎌状赤血球症において、IPDのリスク比は、それぞれ822、122、27であった（海外）。 2014～2021年の10道県サーベイランスでは、6歳以上15歳以下の症例89人中38人（42.7%）が肺炎球菌感染症のハイリスクとなる基礎疾患を有していた（国内）。	小児を含む血液腫瘍疾患・骨髄移植後患者において、PCV13接種後の血清型1、3、5、6A、7F、19Aに対するOPAの上昇と血清型3に対するメモリーB細胞数の上昇が確認されている（国内）。 無脾症患者のPCV7接種による抗体価上昇は良好だが、PPSV23単回接種では抗体保持が不十分（海外）。 PCV15は、鎌状赤血球症、HIV感染者、同種造血幹細胞移植を受けた患者で免疫原性が確認されている。	基礎疾患のある小児に対する肺炎球菌ワクチンの予防効果については現状では十分検証できていない。 小児病院の移植患者のIPDに関する調査では、IPD患者61人中、3回以上肺炎球菌ワクチンを接種していた人は20人にはすぎず、ワクチン接種が不十分であった可能性がある（米国）。	免疫不全症や慢性疾患を基礎疾患として有する小児は、PCV13/PCV15/PCV20未接種の場合、6歳以上であってもPCV20を接種する。もしくはPCV15を接種し、その後8週間以上の間隔をあけて、PPSV23を接種することを推奨する。

はじめに

わが国では 23 価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン (PPSV23、ニューモバックス NP®、ニューモバックス NP シリンジ®)、15 価結合型肺炎球菌ワクチン (PCV15、バクニユバンス®) に次いで、2024 年 8 月に 20 価結合型肺炎球菌ワクチン (PCV20、プレベナ－20®) が高齢者と 64 歳未満のハイリスク者に対して薬事承認された。

小児の定期接種には PCV15 または PCV20、65 歳以上の定期接種には PPSV23 が用いられているが、日本呼吸器学会・日本感染症学会・日本ワクチン学会はハイリスク者の診療領域を専門とする 5 学会（日本循環器学会、日本腎臓学会、日本肝臓学会、日本糖尿病学会、日本リウマチ学会）の協力のもと、2021 年 3 月 17 日に「6 歳から 64 歳のハイリスク者に対する肺炎球菌ワクチン接種の考え方」を、2023 年 6 月 26 日には PCV15 の適応拡大を受け「同 第 2 版」を公表し、65 歳未満のハイリスク者に任意接種としての肺炎球菌ワクチン接種を推奨してきた。このたび、PCV20 の薬事承認を受け、「6 歳から 64 歳のハイリスク者に対する肺炎球菌ワクチン接種の考え方 第 3 版」を公表することとした。

なお、65 歳以上の成人については、上記 3 学会から 2024 年 9 月 6 日に「65 歳以上の成人に対する肺炎球菌ワクチン接種に関する考え方（第 6 版）」を公表している¹⁾。

1. 小児および成人の肺炎球菌の血清型分布の動向について

2010 年 11 月から 5 歳未満小児に導入された PCV7、2013 年 11 月から定期接種になった PCV13 の影響で、小児のワクチン血清型の侵襲性肺炎球菌感染症 (invasive pneumococcal disease, IPD) は劇的に減少した一方、非ワクチン血清型による IPD が増加した²⁾。2023 年の小児 IPD 原因菌の血清型分布は、PCV13 血清型は 2.5% (血清型 3 のみ) と少なく、PCV15 血清型が 10%、PCV20 血清型と PPSV23 血清型がいずれも 35% であった³⁾。その後、2024 年 4 月に PCV15 が、10 月にはそれに加えて PCV20 が小児の定期接種ワクチンとなった。

一方、成人の IPD サーベイランスを開始した 2013 年時点には、すでに成人 IPD の原因菌の血清型分布において原因菌の PCV7 血清型が減少していた。この結果は小児に導入された PCV の間接効果と考えられた⁴⁾。2014 年 10 月から、65 歳以上に対して PPSV23 が定期接種ワクチンとなったが、PPSV23 定期接種導入による成人 IPD の原因菌の血清型分布に対する影響は明らかではない。2013 年から 2019 年にかけて PCV13 血清型による IPD は有意に減少しているが、PPSV23 血清型による IPD には有意な差はみられていない⁵⁾。2023 年の成人 IPD サーベイランスの原因菌の血清型分布は、PCV13 血清型が 26%、PCV15 血清型が 30%、PCV20 血清型と PPSV23 血清型がいずれも 45% であった³⁾。ワクチン血清型の中では、血清型 3 が多く全体の 13% を占めている。

引用文献

1. 感染症・結核学術部会ワクチン WG／日本感染症学会ワクチン委員会／日本ワクチン学会・合同委員会 日. 65 歳以上の成人に対する肺炎球菌ワクチン接種に関する考え方（第

6版 2024年9月6日)

https://www.kansensho.or.jp/uploads/files/guidelines/o65haienV/o65haienV_240930.pdf

. Accessed Feb 18, 2025.

2. Suga S, *et al.* Nationwide population-based surveillance of invasive pneumococcal disease in Japanese children: Effects of the seven-valent pneumococcal conjugate vaccine. *Vaccine* 2015;33(45):6054-6060. doi: 10.1016/j.vaccine.2015.07.069
3. 小児・成人の侵襲性肺炎球菌感染症の疫学情報. <https://ipd-information.com>. Accessed Jan 29, 2025.
4. Fukusumi M, *et al.* Invasive pneumococcal disease among adults in Japan, April 2013 to March 2015: disease characteristics and serotype distribution. *BMC Infect Dis* 2017;17(1):2. doi: 10.1186/s12879-016-2113-y
5. Tamura K, *et al.* Dynamic changes in clinical characteristics and serotype distribution of invasive pneumococcal disease among adults in Japan after introduction of the pediatric 13-valent pneumococcal conjugate vaccine in 2013-2019. *Vaccine* 2022;40(24):3338-3344. doi: 10.1016/j.vaccine.2022.04.062

2. 小児および成人におけるハイリスク者

肺炎球菌は小児・成人において、菌血症を伴わない肺炎、中耳炎等の非侵襲性感染症や髄膜炎、菌血症などの侵襲性感染症を起こす。わが国の2018~2021年の感染症発生動向調査におけるIPDの報告数は5歳未満の小児と65歳以上の高齢者に多いが、5~64歳の年齢層も全体の25.0%を占めている¹⁾。特に55~64歳ではそれ以下の年齢層に比べて報告数の著明な増加が認められる。

1) 6~14歳の小児におけるIPDの基礎疾患

6歳以上でIPD罹患リスクが高い基礎疾患有する小児に対しては、肺炎球菌ワクチンによる積極的な予防が推奨される。しかし、日本小児感染症学会会員を対象として2017年に行われたアンケートでは、定期接種年齢対象外のIPDハイリスク者に対してPCV13も、またPPSV23も十分に接種されている状況ではなかった²⁾。

2014~2021年の全国10道県の小児IPDサーベイランス調査（AMED「菅班」）における年齢層別の基礎疾患の割合を表2に示す³⁾。この期間の小児IPD患者のうち基礎疾患有する者の割合は、5歳以下では13.1%であったのに対して、6~14歳では42.7%と高率であった。6~14歳における主な基礎疾患は、血液・腫瘍性疾患、神経疾患、髄液漏・人工内耳、先天性免疫不全症候群、染色体異常など多かった。

2) 15～64 歳の IPD 患者における基礎疾患

2013～2018 年に 10 道県で実施した成人 IPD サーベイランス（厚生労働科学研究「大石班」）において登録された 1,702 症例の基礎疾患の割合を、15～64 歳と 65 歳以上に分けて表 3 に示す。65 歳以上では基礎疾患を認める症例は 72.2% だったが、15～64 歳では 57.7% と少ない結果であった。15 歳以上の全年齢の基礎疾患としては糖尿病が最も多く、次に治療中の固体癌、ステロイド薬投与、慢性心疾患、自己免疫性疾患等の順であった。15～64 歳の主要な基礎疾患としては、糖尿病、自己免疫性疾患、ステロイド薬投与、慢性肝疾患、固体癌（治療中）と続き、免疫抑制薬投与、脾摘後、先天性無脾／脾低形成、造血幹細胞移植後、慢性腎臓病、慢性心疾患などが認められている。65 歳以上と比べて、15～64 歳において頻度が高い基礎疾患は自己免疫性疾患、慢性肝疾患、脾摘後、造血幹細胞移植後などであった。

15～64 歳の IPD 症例 (n=534) の IPD 発症 5 年以内のワクチン接種率の調査では、PPSV23 接種例は 14 人 (2.3%) であり、PCV13 接種例は 1 人も確認されなかった。一方、65 歳以上の IPD 症例 (n=1,168) のうち PPSV23 接種歴ありは 150 人 (12.8%)、PCV13 の接種歴ありは 2 人 (0.2%)、PCV13・PPSV23 の両方接種ありは 4 人 (0.5%) だった。このように、15～64 歳の IPD 患者における肺炎球菌ワクチンの接種割合は低率であった。

わが国の 12 自治体住民の保険請求データをもとに 2015～2016 年に実施された観察研究によると、肺炎を含む肺炎球菌感染症と関連する基礎疾患は、全年齢では慢性心疾患、慢性肺疾患、慢性肝疾患、糖尿病、がん、慢性腎疾患が多かった⁴⁾。64 歳以下では、50～64 歳における肺炎球菌感染症の 10 万人・年当りの罹患率は 19～49 歳よりも約 5 倍高く (25.6 vs. 5.3)、50～64 歳の基礎疾患は慢性肺疾患、慢性肝疾患、慢性心疾患、糖尿病、がんの順に多かった⁴⁾。

わが国で 2010～2017 年に行われた自主的 IPD サーベイランスによる多施設観察研究では、6～64 歳の IPD 患者の 72.6% が基礎疾患有し、がん (19.9%)、糖尿病 (18.9%)、肝疾患 (16.6%)、心血管疾患 (10.5%)、先天性免疫不全症 (9.9%)、神経精神疾患 (9.9%) の順であった⁵⁾。また、免疫不全以外の基礎疾患有 2 つ以上持つ患者は、基礎疾患有 1 つない IPD 患者に比べて、IPD による死亡リスクが有意に高かった (ハザード比 HR 2.6)⁵⁾。

表2 小児IPD患者の年齢層別基礎疾患の割合（2014～2021年）

年齢グループ	年代別患者数、No. (%)		
	0～14歳	0～5歳	6～14歳
患者数 (%)	903 (100)	814 (100)	89 (100)
基礎疾患あり	145 (16.1)	107 (13.1)	38 (42.7)
基礎疾患の種類			
先天性免疫不全症候群	8 (0.9)	5 (0.6)	3 (3.4)
血液疾患、小児がん	15 (1.7)	5 (0.6)	10 (11.2)
無脾症	5 (0.6)	5 (0.6)	0 (0.0)
臓器移植後	4 (0.4)	2 (0.2)	2 (2.2)
髄液漏、人工内耳、頭部外傷	5 (0.6)	1 (0.1)	4 (4.5)
染色体異常	10 (1.1)	7 (0.9)	3 (3.4)
神経疾患、てんかん	21 (2.3)	16 (2.0)	5 (5.6)
心疾患	31 (3.4)	30 (3.7)	1 (1.1)
先天性心疾患	31 (3.4)	30 (3.7)	1 (1.1)
腎疾患	20 (2.2)	18 (2.2)	2 (2.2)
ネフローゼ症候群	10 (1.1)	8 (1.0)	2 (2.2)
アレルギー疾患	9 (1.0)	7 (0.9)	2 (2.2)
気管支喘息	7 (0.8)	5 (0.6)	2 (2.2)
早産児、低出生体重児	10 (1.1)	9 (1.1)	1 (1.1)
その他	23 (2.5)	15 (1.8)	8 (9.0)

表3 成人IPD患者の年齢層別基礎疾患の割合（2013～2018年）

年齢グループ	年代別患者数、No. (%)		
	15歳以上	15～64歳	65歳以上
患者数 (%)	1,702 (100)	534 (100)	1,168 (100)
基礎疾患あり	1,151 (67.6)	308 (57.7)	843 (72.2)
基礎疾患の種類			
糖尿病	255 (15.0)	57 (10.7)	198 (17.0)
固形癌（治療中）	170 (10.0)	36 (6.7)	134 (11.5)
ステロイド薬投与	124 (7.3)	39 (7.3)	85 (7.3)
慢性心疾患	123 (7.2)	12 (2.2)	111 (9.5)
自己免疫性疾患	112 (6.6)	41 (7.7)	71 (6.1)
悪性腫瘍の既往	109 (6.4)	12 (2.2)	97 (8.3)
慢性閉塞性肺疾患	98 (5.8)	9 (1.7)	89 (7.6)
慢性腎臓病	80 (4.7)	16 (3.0)	64 (5.5)
心血管障害	73 (4.3)	6 (1.1)	67 (5.7)
慢性肝疾患	72 (4.2)	39 (7.3)	33 (2.8)
免疫抑制薬投与	44 (2.6)	25 (4.7)	19 (1.6)
脾摘後	39 (2.3)	22 (4.1)	17 (1.5)
先天性無脾/脾低形成	30 (1.8)	17 (3.2)	13 (1.1)
造血幹細胞移植後	22 (1.3)	19 (3.6)	3 (0.3)
生物製剤投与	21 (1.2)	9 (1.7)	12 (1.0)

引用文献

1. 国立感染症研究所. IASR 44 (2023年1月号) 肺炎球菌感染症 2022年現在 図2.
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/pneumococcal-m/1372-idsc/iasr-topic/11763-515t.html>. Accessed Jan 29, 2025.
2. 竹下健一, 他. ハイリスク小児におけるインフルエンザ菌 b 型ワクチン、肺炎球菌ワクチン接種状況に関するアンケート. 小児感染免疫 2018;30(1):57-62
3. 小児・成人の侵襲性肺炎球菌感染症の疫学情報. <https://ipd-information.com>. Accessed Jan 29, 2025.
4. Fukuda H, et al. Risk factors for pneumococcal disease in persons with chronic medical conditions: Results from the LIFE Study. Int J Infect Dis 2022;116:216-222. doi: 10.1016/j.ijid.2021.12.365
5. Hanada S, et al. Multiple comorbidities increase the risk of death from invasive pneumococcal disease under the age of 65 years. J Infect Chemother 2021;27(9):1311-1318. doi: 10.1016/j.jiac.2021.04.018

3. 慢性心疾患

【病態の特徴】

慢性心疾患、特に慢性心不全で肺炎リスクが高まる理由として、心拡大に伴う気管支の圧迫による換気障害、肺うつ血による気道分泌物の增量および喀痰の喀出困難などが考えられる。また心不全下では心拍出量が低下しているため、肺炎を発症した際は通常より容易に低酸素状態に陥り心不全の急性増悪を来しやすい。さらに肺炎によって誘導される炎症性サイトカインや酸化ストレスによって動脈硬化の進展や心機能の低下が起り、間接的に心不全の急性増悪へとつながるおそれがある¹⁾。台湾のナショナルデータベースを用いた13年間の長期的コホート研究では、急性冠症候群 (acute coronary syndrome: ACS) 罹患歴のない20歳以上の肺炎球菌性肺炎患者 20,111名と肺炎球菌性肺炎罹患歴のない対象患者 80,444名を比較し、年齢に関係なく肺炎球菌性肺炎に罹患することで ACS 罹患リスクが増加し、特に40～54歳において罹患率比 (IRR) 3.52と最も高かった²⁾。肺炎球菌性肺炎患者では心房細動などの不整脈や心不全などの心疾患イベントの発症リスクが高まることも報告されている³⁾。

【肺炎球菌感染症の発生頻度と予後】

デンマークで行われた15歳以上の肺炎患者 67,162人とコントロール 671,620人の症例対照研究では、心不全患者と非心不全患者での肺炎リスクを比較検討し、慢性心不全を有する場合の肺炎発症リスクのオッズ比 (OR) は 1.81 (95% CI 1.76-1.86) と高かった⁴⁾。

米国で実施された 2006～2010 年の医療費請求統合データベースを用いた基礎疾患別の肺炎球菌感染症の発症率に関する後方視的解析では、慢性心疾患を有する 65 歳以上の高齢者の肺炎球菌性肺炎の発症リスクは基礎疾患がない場合より 3.8 倍 (95% CI 3.8-3.8) 高かった⁵⁾。2008～2009 年に英国で実施された侵襲性肺炎球菌感染症 (IPD) 22,298 例の解析では、致命率を並存疾患ごとに評価し、基礎疾患のない 16～64 歳は 5.4% であったのに対し、同年代の慢性心不全合併では 19.7% (4.3 倍)、基礎疾患のない 65 歳以上では 29.1%であるのに対し、慢性心不全合併では 36.2% と 1.4 倍のリスクであったことが報告されている⁶⁾。本邦では JMDC (Japan Medical Data Center) と MDV (Medical Data Vision) のデータベースをもとに、1,040 万人 (19 歳以上) を対象として基礎疾患と肺炎球菌性肺炎および IPD の発症リスクに関する後方視的観察コホート研究が実施されており、いずれのデータベースでも慢性心疾患を有する患者の肺炎球菌性肺炎と IPD の発症リスクは、健常人と比較して JMDC でそれぞれ 7.1 (95%CI 5.7-8.8)、15.7 (95%CI 8.8-28.0)、MDV で 2.6 (95%CI 2.3-2.9)、4.7 (95%CI 2.8-7.9) と高かった⁷⁾。

このように慢性心疾患では肺炎球菌性肺炎や IPD を合併しやすく、その致命率も高いと考えられる。

【肺炎球菌ワクチンの免疫原性】

慢性心疾患を有する患者のみを対象とした肺炎球菌ワクチンの免疫原性に関する評価は行われていない。肺炎球菌感染症の罹患リスクを有する肺炎球菌ワクチン接種歴のない 6～64 歳の日本人に PCV13 を単回接種したときの安全性、忍容性および免疫原性の評価が行われている⁸⁾。この非盲検試験では合計 200 人が PCV13 を接種され、接種対象者には心血管疾患を基礎疾患に有する者が 6～17 歳で 11.3%、18～65 歳未満で 11.8% が含まれていた。免疫原性は PCV13 接種 1 か月後の OPA を 13 の血清型について評価し、その増加倍率 (OPA GMFR) で行われている。その結果、65 歳未満の全被験者において 13 種類の血清型すべてについて PCV13 接種前と比較して OPA の増加がみられた⁸⁾。

また 105 人の介護施設入所中の 80 歳以上の高齢者 (うつ血性心不全の患者が PCV7 接種群で 24.5%、PPSV23 接種群で 19.6% 含まれる) を対象とした PPSV23 と PCV7 の免疫原性の比較研究も行われている⁹⁾。免疫原性は IgG 抗体値 (GMC) と OPA で評価されており、いずれのワクチンでも免疫原性は認められたが、PCV7 含有血清型については PCV7 の方が PPSV23 より高かったと報告されている⁹⁾。

慢性心疾患などの肺炎球菌感染症リスク因子を有する患者を含む 18～49 歳の成人を対象に行われた PCV13 または PCV15 と PPSV23 の 6 か月間隔の連続接種における免疫原性を評価した海外第 III 相比較試験では、PPSV23 接種前に比べて、連続接種 1 か月後の IgG 抗体値 (GMC) と OPA はすべての血清型で上昇していた¹⁰⁾。

肺炎球菌ワクチン未接種の成人を対象とした第 III 相・ランダム化・二重盲検試験の事後解析では、18～64 歳および 18～49 歳の参加者のうち、肺炎球菌感染症の発症リスクが高い

慢性疾患有する成人または喫煙者におけるPCV20の免疫原性が評価された¹¹⁾。1,329人（全体の30%）が心血管系疾患有する1つ以上のリスク因子を有しており、PCV20接種前と比較し接種1か月後ではPCV20に含まれる全ての血清型でOPA幾何平均力値が大幅に増加した¹¹⁾。

このように慢性心疾患患者を含むハイリスク群において、肺炎球菌ワクチンの免疫原性は十分認められ、特に結合型ワクチンにおいて高く、PCV15とPCV20で大差はないと考えられるが、その維持期間については明確ではない。

【ワクチン予防効果】

肺炎球菌ワクチンによる心疾患の増悪抑制に関するエビデンスは十分ではない。スペインで実施された60歳以上の高齢者27,204例を対象とした集団ベースの前方視的コホート研究では、34%がPPSV23を接種されているが、ワクチン接種と心筋梗塞の発症頻度に相関性は示されていない¹²⁾。一方、米国で実施された107,045名の心不全を有する退役軍人を対象とした後方視的研究では、PPSV23接種によって1年後の致命率が調整後OR 0.77と有意に低下したと報告されている¹³⁾。さらにカナダで実施された18歳以上の市中肺炎患者6,171人（平均年齢59歳）を対象とした集団ベースの前方視的コホート研究では、PPSV23接種群（n=724）と未接種群（n=724）で傾向スコア解析を行い、PPSV23接種群ではACS発生率が調整後ハザード比（HR）0.46（95% CI 0.28-0.73）と有意に低下した¹⁴⁾。肺炎球菌ワクチン接種による心保護作用（炎症性サイトカイン制御による心不全の増悪・急性冠症候群への進展防止、ワクチン接種によって誘導される肺炎球菌特異的IgM抗体の酸化LDLコレステロールへの結合とマクロファージへの取り込み抑制による動脈硬化進展の抑制）がその要因として考えられている¹⁵⁾。さらに心血管疾患有する患者の全死亡率と肺炎球菌ワクチン接種の関連について系統的レビューが実施され、合計163,756人を含む5つの観察研究のメタ解析の結果、PCV13および／またはPPSV23接種群は、対照群（ワクチンのプラセボまたは非接種群）と比較し、全死亡率が22%減少したと報告されている¹⁶⁾。

わが国の自治体保有の健康関連データを基にした症例対照研究（VENUS study）でも、PPSV23接種者は非接種者に比べて、心筋梗塞と脳卒中の発生頻度がそれぞれオッズ比（OR）0.70（95% CI 0.62-0.80）とOR 0.81（95% CI 0.77-0.86）で有意に低かったことが報告されている¹⁷⁾。特に、接種後180日以内の心筋梗塞の発生頻度は、接種後720日以降に比べてOR 0.55（95% CI 0.42-0.72）とさらに低かった。

慢性心疾患に限定し肺炎球菌ワクチンの効果を検討した論文は少ないものの、肺炎球菌感染症の予防効果および心不全増悪・心血管イベント発症の抑制効果は期待できると思われる。日本循環器学会／日本心不全学会合同ガイドラインでは、心不全患者では感染症を契機に症状の増悪をきたすことが多いため、インフルエンザや肺炎球菌感染症に対するワクチン接種が推奨されている¹⁸⁾（2025年3月末改訂予定）。

【肺炎球菌ワクチンの接種推奨の要点】

- 1) 慢性心疾患患者は、肺炎球菌性肺炎や IPD に罹患するリスクが高い。肺炎球菌性肺炎に罹患すると、心不全の急性増悪や虚血性心疾患を併発し生命予後が悪化する危険性があり、肺炎球菌ワクチンによる肺炎予防は重要である。
- 2) 慢性心疾患患者に限定した肺炎球菌ワクチンの肺炎球菌感染症予防効果を検証したランダム化比較試験 (RCT) は存在しないが、肺炎球菌感染症罹患に伴う心不全の増悪や虚血性心疾患の予防効果が期待でき、免疫原性もみられるため接種が推奨される。
- 3) 慢性心疾患患者は心不全だけでなく、慢性肺疾患、慢性腎疾患、糖尿病など複数のリスク因子を有していることも少なくなく、複数のリスク因子を有する場合の IPD の予後は不良であるため¹⁹⁾、肺炎球菌ワクチンの接種が推奨される。
- 4) ワクチン接種歴のない 19 歳から 64 歳の慢性心疾患患者に対する肺炎球菌ワクチンの接種方法について、米国 Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) は PCV20、PCV21（日本未承認）の 1 回接種、あるいは PCV15 と PPSV23 の連続接種を推奨している^{20, 21)}。
- 5) わが国においては慢性心疾患患者に対する、PCV20 単回接種および PCV15 と PPSV23 連続接種の免疫原性や安全性、予防効果等のデータがなく、現段階では PPSV23 単回接種の推奨が適切と考えられる。しかしながら、発症した場合の生命予後が不良と考えられる場合、または慢性腎不全や重度の糖尿病を合併し全身的な免疫能低下が予想される場合は、PCV20 の単回接種または PCV15 と PPSV23 の連続接種も選択肢として考えられる。

引用文献

1. Bhatt AS, *et al.* Can vaccinations improve heart failure outcomes?: contemporary data and future directions. *JACC Heart Fail* 2017;5(3):194-203. doi: 10.1016/j.jchf.2016.12.007
2. Wang CC, *et al.* Pneumococcal pneumonia and the risk of acute coronary syndrome: a population-based cohort study. *Int J Cardiol* 2013;168(4):4480-4481. doi: 10.1016/j.ijcard.2013.06.134
3. Musher DM, *et al.* The association between pneumococcal pneumonia and acute cardiac events. *Clin Infect Dis* 2007;45(2):158-165. doi: 10.1086/518849
4. Mor A, *et al.* Chronic heart failure and risk of hospitalization with pneumonia: a population-based study. *Eur J Intern Med* 2013;24(4):349-353. doi: 10.1016/j.ejim.2013.02.013
5. Shea KM, *et al.* Rates of pneumococcal disease in adults with chronic medical conditions. *Open Forum Infect Dis* 2014;1(1):ofu024. doi: 10.1093/ofid/ofu024

6. van Hoek AJ, *et al*. The effect of underlying clinical conditions on the risk of developing invasive pneumococcal disease in England. *J Infect* 2012;65(1):17-24. doi: 10.1016/j.jinf.2012.02.017
7. Imai K, *et al*. Risk of pneumococcal diseases in adults with underlying medical conditions: a retrospective, cohort study using two Japanese healthcare databases. *BMJ Open* 2018;8(3):e018553. doi: 10.1136/bmjopen-2017-018553
8. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構. プレベナー13 水性懸濁注 審査報告書. https://www.pmda.go.jp/drugs/2020/P20200512001/671450000_22500AMX00917_A100_1.pdf. Accessed Jan 30, 2025.
9. Namkoong H, *et al*. Comparison of the immunogenicity and safety of polysaccharide and protein-conjugated pneumococcal vaccines among the elderly aged 80 years or older in Japan: an open-labeled randomized study. *Vaccine* 2015;33(2):327-332. doi: 10.1016/j.vaccine.2014.11.023
10. Hammitt LL, *et al*. Phase 3 trial to evaluate the safety, tolerability, and immunogenicity of V114, a 15-valent pneumococcal conjugate vaccine, followed by 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine 6 months later, in at-risk adults 18-49 years of age (PNEU-DAY): A subgroup analysis by baseline risk factors. *Hum Vaccin Immunother* 2023;19(1):2177066. doi: 10.1080/21645515.2023.2177066
11. Sabharwal C, *et al*. Immunogenicity of a 20-valent pneumococcal conjugate vaccine in adults 18 to 64 years old with medical conditions and other factors that increase risk of pneumococcal disease. *Hum Vaccin Immunother* 2022;18(6):2126253. doi: 10.1080/21645515.2022.2126253
12. Vila-Corcoles A, *et al*. Clinical effectiveness of pneumococcal vaccination against acute myocardial infarction and stroke in people over 60 years: the CAPAMIS study, one-year follow-up. *BMC Public Health* 2012;12:222. doi: 10.1186/1471-2458-12-222
13. Wu WC, *et al*. Association between process quality measures for heart failure and mortality among US veterans. *Am Heart J* 2014;168(5):713-720. doi: 10.1016/j.ahj.2014.06.024
14. Eurich DT, *et al*. Pneumococcal vaccination and risk of acute coronary syndromes in patients with pneumonia: population-based cohort study. *Heart* 2012;98(14):1072-1077. doi: 10.1136/heartjnl-2012-301743
15. Ciszewski A. Cardioprotective effect of influenza and pneumococcal vaccination in patients with cardiovascular diseases. *Vaccine* 2018;36(2):202-206. doi: 10.1016/j.vaccine.2017.11.078

16. Marques Antunes M, *et al.* Pneumococcal vaccination in adults at very high risk or with established cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis. *Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes* 2021;7(1):97-106. doi: 10.1093/ehjqcco/qcaa030
17. Narii N, *et al.* Association of pneumococcal vaccination with cardiovascular diseases in older adults: The vaccine effectiveness, networking, and universal safety (VENUS) study. *Vaccine* 2023;41(13):2307-2313. doi: 10.1016/j.vaccine.2023.02.077
18. 日本循環器学会/日本心不全学会. 2021年 JCS/JHFS ガイドライン フォーカスアップデート版 急性・慢性心不全診療. https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/03/JCS2021_Tsutsui.pdf. Accessed Feb 1, 2025.
19. Hanada S, *et al.* Multiple comorbidities increase the risk of death from invasive pneumococcal disease under the age of 65 years. *J Infect Chemother* 2021;27(9):1311-1318. doi: 10.1016/j.jiac.2021.04.018
20. Kobayashi M, *et al.* Pneumococcal vaccine for adults aged \geq 19 years: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices, United States, 2023. *MMWR Recomm Rep* 2023;72(3):1-39. doi: 10.15585/mmwr.rr7203a1
21. Kobayashi M, *et al.* Use of 21-valent pneumococcal conjugate vaccine among U.S. adults: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices - United States, 2024. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2024;73(36):793-798. doi: 10.15585/mmwr.mm7336a3

4. 慢性肺疾患

【病態の特徴】

慢性閉塞性肺疾患 (COPD) や気管支拡張症、間質性肺炎をはじめとした慢性肺疾患患者では、気道クリアランスの低下に伴い、末梢気道の炎症による喀痰量増加や局所免疫の低下がみられ、また、ステロイド薬や免疫抑制薬等の使用によって全身的な免疫低下をきたしている場合も多い。その結果、健常者と比較しウイルス感染や二次性の細菌感染症を起こしやすく、末梢気道の狭窄や肺胞構造の破壊による呼吸機能低下が基礎にあるため、重度の呼吸不全を合併しやすい。COPD と下気道感染症はそれぞれ世界の死亡原因の第 3 位、第 4 位とされている。

【肺炎球菌感染症の発生頻度と予後】

1) 侵襲性肺炎球菌感染症 (IPD) 発生頻度

国外データ：米国 ABCs (Active Bacterial Core surveillance) と NHIS (National Health Interview Survey) を用いた報告¹⁾では、1999～2000 年の成人慢性肺疾患患者における IPD

罹患率は 10 万人対 62.9 で、健常者と比較して 5.6 倍高かった。65 歳未満においても慢性肺疾患患者は健常者と比較して IPD 罹患率が高く、年齢別では、35～49 歳で 10 万人対 16.3、50～64 歳で 57.2 であった。同サーベイランスを用いた PCV13 導入前後の IPD 発生頻度をみた研究では²⁾、65 歳未満の成人慢性肺疾患患者における IPD 罹患率は 2007～2008 年 10 万人対 16.0（健常者 7.7）、2013～2014 年 13.9（健常者 3.9）であり、PCV13 導入後の IPD 血清型は PCV13 型が減少し、PPSV23 型や非ワクチン型が増加していた。また、米国の医療費請求リポジトリ（2006～2010 年）を用いた報告³⁾においても、65 歳未満の慢性肺疾患患者での IPD 罹患率は健常者と比較して高く、18～49 歳で 6.3 倍、50～64 歳で 7.7 倍であった。

国内データ：JMDC（Japan Medical Data Center）データベースを使用して算出した慢性肺疾患患者における 10 万人当りの IPD 罹患率は、19～49 歳で 0、50～64 歳で 19.7 であり、50～64 歳では健常者と比較して 12.9 倍であった⁴⁾。MDV（Medical Data Vision）データベースを使用して算出した慢性肺疾患患者における 10 万人当りの IPD 罹患率は、19～49 歳で 5.9、50～64 歳で 18.4 であり、健常者と比較してそれぞれ 6.5 倍、21.4 倍であった。

2) 肺炎球菌性肺炎発生頻度

国外データ：米国医療費請求リポジトリ（2006～2010 年）を用いた報告³⁾では、健常者と比較した慢性肺疾患患者における肺炎球菌性肺炎罹患率は、18～49 歳で 8.9 倍、50～64 歳で 9.8 倍であった。

国内データ：JMDC データベースを使用して算出した慢性肺疾患患者における 10 万人当りの肺炎球菌性肺炎罹患率は 19～49 歳で 51.6、50～64 歳で 143.1 であり、健常者と比較してそれぞれ 8.2 倍、12.8 倍であった。MDV データベースを使用して算出した慢性肺疾患患者における 10 万人当りの肺炎球菌肺炎罹患率は 19～49 歳で 97.8、50～64 歳で 212.1 であり、健常者と比較してそれぞれ 5.6 倍、6.8 倍であった⁴⁾。

【肺炎球菌ワクチンの免疫原性】

国外データ：台湾の成人 COPD 患者（n=80、65 歳未満 11 例含む）に PPSV23 を接種し、6 週後に 8 種の血清型（4、6B、7F、9V、14、18C、19F、23F）に対する特異 IgG 濃度を測定した結果、すべての血清型において 2 倍以上の IgG 濃度上昇がみられた⁵⁾。また米国の 40 歳以上の成人 COPD 患者 181 人を PPSV23 接種群（90 人、平均年齢 64 歳）と PCV7 接種群（91 人、平均年齢 63 歳）に割り付けて、接種 1 か月、1 年、2 年後にそれぞれ 7 種の血清型に対する特異的 IgG および特異的 OPA を測定した結果、PCV7 群は PPSV23 群と比較して、大部分の血清型に対して特異的 IgG および OPA 値が高い傾向を示した^{6, 7)}。また、リスク因子を有する 18～49 歳の成人を対象に 6 か月間隔で PCV15-PPSV23、また

は PCV13-PPSV23 を連続接種した第 III 相試験のサブ解析では、慢性肺疾患患者においても安全性が確認され、各血清型に対する特異的 IgG 濃度と OPA 値も保たれていた⁸⁾。

国内データ：40 人の慢性肺疾患患者（平均年齢 77 歳）に対して PPSV23 を平均 7 年 7 か月間隔で 2 回接種し、4 種類の血清型（6B、14、19F、23F）に対する特異的 IgG 濃度と OPA を測定した結果、血清型 6B 以外においては IgG 濃度と OPA 値の上昇がみられ、さらに 2 回接種による安全性も確認された⁹⁾。

【ワクチン予防効果】

12 のランダム化比較試験（RCT）を解析対象としたシステムティック・レビュー・メタアナリシスで、PPSV23 の COPD 患者（2,171 人、平均年齢 66 歳）に対する肺炎予防効果について検討した結果、PPSV23 接種群は非接種群と比較して、市中肺炎の発生が有意に減少し（オッズ比 OR 0.61、95% CI 0.42-0.89）、COPD の増悪予防効果が見られた（OR 0.60、95%CI 0.39-0.93）が、肺炎球菌性肺炎の発症率には有意差は見られなかった（OR 0.26、95%CI 0.05-1.31）¹⁰⁾。

このメタアナリシスに含まれる論文で、596 人の COPD 患者を対象とした RCT（平均年齢 65.8 歳）における 65 歳未満の部分集団での比較では、PPSV23 接種による市中肺炎の予防効果（76%）がみられ、肺炎球菌性肺炎 5 例はすべて PPSV23 非接種群に発生していた¹¹⁾。また、%FEV1.0 が 40% 未満の群で市中肺炎の予防効果（91%）がみられた。

香港における疾患コードを用いた 7 年間のデータベースを基にした後ろ向き研究で、インフルエンザで入院した慢性気道疾患（喘息、気管支拡張症、COPD）を有する全ての成人患者 3,066 人（年齢平均値 76.2 歳）を対象とし、肺炎球菌ワクチン（PPSV23/PCV13）連続接種群と非接種群の間で、二次性細菌性肺炎、死亡率、およびその他の重度の院内転帰の発生を比較した。PPSV23/PCV13 の連続接種群では、二次性細菌性肺炎、全原因死亡率、および呼吸器原因死亡率の発生が有意に減少し、調整後オッズ比はそれぞれ 0.74（95% CI 0.57-0.95、p = 0.019）、0.12（95% CI 0.03-0.53、p = 0.005）、および 0.04（95% CI 0.00-0.527、p = 0.0038）であった¹²⁾。

【肺炎球菌ワクチンの接種推奨の要点】

- 1) 肺炎球菌感染症の発生頻度について、健常者と比較して 65 歳未満の成人では 5 倍以上の IPD と肺炎球菌性肺炎の発生リスクがある。65 歳未満の重症例を含む COPD 患者において PPSV23 接種の肺炎予防効果が確認されていることから、同年齢層の重症例を含む慢性肺疾患患者に対して PPSV23 接種が推奨できると考えられる。
- 2) 免疫原性については、ワクチン接種後に大部分の血清型について特異的 IgG 濃度が上昇し、OPA も得られている。PCV13 と PPSV23 の免疫原性の比較では、PCV13 の方がやや優れている。また、PPSV23 の 2 回接種による安全性や抗体価の再上昇も得ら

れていることから、65歳未満でのPPSV23の5年間隔での再接種は可能な選択肢である。

- 3) 65歳未満の重症慢性肺疾患患者に対するPCV20の単回接種またはPCV15-PPSV23の連続接種についても有用な選択肢と考える。

引用文献

1. Kyaw MH, *et al*. The influence of chronic illnesses on the incidence of invasive pneumococcal disease in adults. *J Infect Dis* 2005;192(3):377-386. doi: 10.1086/431521
2. Ahmed SS, *et al*. Early impact of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine use on invasive pneumococcal disease among adults with and without underlying medical conditions-United States. *Clin Infect Dis* 2020;70(12):2484-2492. doi: 10.1093/cid/ciz739
3. Shea KM, *et al*. Rates of pneumococcal disease in adults with chronic medical conditions. *Open Forum Infect Dis* 2014;1(1):ofu024. doi: 10.1093/ofid/ofu024
4. Imai K, *et al*. Risk of pneumococcal diseases in adults with underlying medical conditions: a retrospective, cohort study using two Japanese healthcare databases. *BMJ Open* 2018;8(3):e018553. doi: 10.1136/bmjopen-2017-018553
5. Lai CC, *et al*. Antibody responses to pneumococcal polysaccharide vaccine in Taiwanese patients with chronic obstructive pulmonary disease. *J Formos Med Assoc* 2007;106(3):196-203. doi: 10.1016/S0929-6646(09)60240-0
6. Dransfield MT, *et al*. Long-term comparative immunogenicity of protein conjugate and free polysaccharide pneumococcal vaccines in chronic obstructive pulmonary disease. *Clin Infect Dis* 2012;55(5):e35-44. doi: 10.1093/cid/cis513
7. Dransfield MT, *et al*. Superior immune response to protein-conjugate versus free pneumococcal polysaccharide vaccine in chronic obstructive pulmonary disease. *Am J Respir Crit Care Med* 2009;180(6):499-505. doi: 10.1164/rccm.200903-0488OC
8. Hammitt LL, *et al*. Phase 3 trial to evaluate the safety, tolerability, and immunogenicity of V114, a 15-valent pneumococcal conjugate vaccine, followed by 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine 6 months later, in at-risk adults 18-49 years of age (PNEU-DAY): A subgroup analysis by baseline risk factors. *Hum Vaccin Immunother* 2023;19(1):2177066. doi: 10.1080/21645515.2023.2177066
9. Ohshima N, *et al*. Sustained functional serotype-specific antibody after primary and secondary vaccinations with a pneumococcal polysaccharide vaccine in elderly patients with chronic lung disease. *Vaccine* 2014;32(10):1181-1186. doi: 10.1016/j.vaccine.2013.09.060

10. Walters JA, *et al*. Pneumococcal vaccines for preventing pneumonia in chronic obstructive pulmonary disease. *Cochrane Database Syst Rev* 2017;1:CD001390. doi: 10.1002/14651858.CD001390.pub4
11. Alfageme I, *et al*. Clinical efficacy of anti-pneumococcal vaccination in patients with COPD. *Thorax* 2006;61(3):189-195. doi: 10.1136/thx.2005.043323
12. Kwok WC, *et al*. Protective effects from prior pneumococcal vaccination in patients with chronic airway diseases during hospitalization for influenza-A territory-wide study. *Vaccines (Basel)* 2024;12(7). doi: 10.3390/vaccines12070704

5. 慢性腎臓病

【病態の特徴】

慢性腎臓病 (chronic kidney disease: CKD) では免疫能の低下が指摘されており、B リンパ球の減少、CD4 陽性 T リンパ球数の減少が認められ、T リンパ球の抗原刺激に対する反応性低下、好中球の機能低下も指摘されている¹⁾。したがって、CKD 患者では感染症の併発リスクが高い。腎機能低下が進み末期腎不全、血液透析となるとさらに感染症の併発リスクが上昇し、感染症はわが国の慢性透析患者の死因の第 1 位である²⁾。

【肺炎球菌感染症の発生頻度と予後】

CKD の感染症による入院リスクについて行われた研究³⁾では、感染症による入院リスクは腎機能正常者 (eGFR ≥ 90 mL/min/1.73 m²) に対して、eGFR 15~29 mL/min/1.73 m² ではハザード比 (HR) 2.55 (95%信頼区間 (CI) 1.43-4.55)、eGFR 30~59 mL/min/1.73 m² では 1.48 (95%CI 1.28-1.71) と高い。感染症の中では肺炎が最も多く、腎機能の低下とともに併発リスクが増し、それぞれの eGFR で HR 2.21 (95%CI 0.95-5.11)、1.44 (95%CI 1.15-1.79) であった。保存期CKD 患者の感染症による入院後の 30 日以内の死亡は、それぞれの eGFR で HR 3.76 (95%CI 1.48-9.58)、1.62 (95%CI 1.20-2.19) と高く、保存期CKD において感染症は予後不良因子である。

わが国の national database (NDB) を用いた肺炎による入院患者の予後研究⁴⁾でも、CKD が肺炎による死亡リスク因子であるという報告があり、CKD 患者の肺炎による入院後 30 日以内の死亡リスクは HR 1.82 (95%CI 1.24-2.47) であった。

スペインからの報告では、保存期CKD 患者および慢性透析患者の生命予後を規定する肺炎の原因菌として肺炎球菌が最も多く、CKD 合併肺炎 (n=203) の原因菌の 28.1% を占めたという報告⁵⁾がある。

基礎疾患の有無による侵襲性肺炎球菌感染症 (IPD) のリスクを年齢層別に検討した (2008~2009 年、イギリス) 結果⁶⁾では、IPD は 22,298 例 (2~15 歳 1,507 例、16

～64 歳 9,577 例、65 歳以上 11,214 例）あり、ネフローゼ症候群、慢性腎不全や腎移植を含む CKD 患者の致命率は 16～64 歳 26.1%、65 歳以上 44% と高く、基礎疾患のない症例と比較すると、16～64 歳ではオッズ比（OR）6.2（95%CI 4.8-7.9）、65 歳以上では OR 1.9（95%CI 1.7-2.2）であった。

CKD では肺炎球菌性肺炎や IPD を合併し、致命率も高いと考えられる。

【肺炎球菌ワクチンの免疫原性】

CKD 患者では免疫能の低下のため、ワクチンの免疫原性は低下すると考えられる。

33 人のネフローゼ症候群患者に PCV7 を接種し、血清型特異的抗 IgG 抗体を測定したところ、1 か月後には抗体価の有意な上昇を認めたが、健常者と比べ抗体価はやや低値で、1 年後には低下傾向であった⁷⁾。

42 人の小児ネフローゼ症候群患者に PCV13 を接種し、血清型特異的 IgG 抗体を測定したところ、3 か月後には抗体価の上昇を認め、1 年後にも高い抗体価を維持したという報告もある⁸⁾。

155 人の血液透析患者において PPSV23 および PCV13 接種後の血清型特異的 IgG 抗体と OPA を比較した前向き研究⁹⁾では、接種後 4 週目ではともに IgG 抗体、OPA が上昇した。PCV13 の方が有意に上昇した血清型は、IgG 抗体では 6 種類、OPA では 2 種類であった。しかし、52 週後には抗体価は低下し、PCV13 の方が有意に高値を示したのは IgG 抗体 1 種類であり、OPA には差が無かった。また、PPSV23 を先行して接種した群に PCV13 を接種した場合、PCV13 の免疫原性は低下していた。

CKD における肺炎球菌ワクチンの免疫原性は健常者に比べやや低下するものの十分認められる。しかし、どのくらいの期間維持されるかについては明確ではない。

【ワクチン予防効果等】

CKD 患者では肺炎と IPD のリスクが高いが、肺炎球菌ワクチンによる両者の予防効果についての RCT はない。しかしながら、臨床的な有効性を示す報告がある。

肺炎で入院した保存期CKD患者および慢性透析患者203 人では、PPSV23 の接種歴がある群で有意に死亡の割合が低かった（OR=0.05、95%CI 0.005-0.69）⁵⁾。ただし、死亡原因についての言及はない。

米国で 2003～2005 年に血液透析を開始した患者 118,533 人を対象に PPSV23 の入院および死亡に対する効果をみた研究¹⁰⁾では、PPSV23 は死亡を有意に減らし（HR 0.94、95%CI 0.90-0.98）、心疾患死を減らし（HR 0.91、95% CI 0.85-0.97）、菌血症・敗血症・ウイルス血症による入院を減らした（HR 0.95、95% CI 0.91-1.00）。PPSV23 とインフルエンザワクチンを接種した群の死亡は HR 0.73（95% CI 0.68-0.78）で低かった。

血液透析患者および腹膜透析患者において 2005/2006 年のインフルエンザシーズンにインフルエンザワクチンと PPSV23 を接種した群では全死亡が有意に減少し、両ワクチンは

独立して効果を示した¹¹⁾。死亡のORは、PPSV23単独接種群で0.76(96%CI 0.70-0.82)、PPSV23とインフルエンザワクチンの両方接種群で0.61(96%CI 0.55-0.68)であった。

わが国の血液透析患者510人についてPPSV23の効果をみた研究¹²⁾では、PPSV23接種群では非接種群に比べ、全死亡が有意に減少し(HR 0.62、95%CI 0.46-0.83)、心血管疾患による入院が有意に減少し(HR 0.44、95%CI 0.20-0.9)、心疾患による死亡が有意に減少した(HR 0.36、95%CI 0.18-0.71)。しかしながら、肺炎による入院と死亡については両群に差がなく、著者らはPPSV23の心血管疾患に対する直接的な予防効果と推察している。

腎機能低下例を含む米国のtest negative study¹³⁾では、PCV13、PPSV23接種例180例、対照3,889例(平均年齢69歳、女性48%、白人97%、平均eGFR 71mL/min/1.73m²)で、肺炎球菌感染症による入院に対するワクチンの有効性を比較した。PCV13の有効性(VE)は39%(95%CI 13-58)、PCV13とPPSV23の併用のVEは39%(95%CI 12-58)であった。PPSV23のVEは-3.7%(95%CI -57-32)であった。eGFRで層別化すると、PCV13のVEは、eGFR \geq 60[VE 38%(95%CI 2.9-61)]およびeGFR 30~59[VE 61%(95%CI 24-80)]で一貫しており、PCV13接種によってeGFR 30~59の患者においても肺炎球菌感染症による入院リスクが低下することが明らかになった。eGFR<30ではサンプルサイズが小さいためVEは算出できなかった。

【肺炎球菌ワクチンの接種推奨の要点】

CKDにおける肺炎球菌ワクチンの有効性を検討した論文は少ないが、上記のように心血管疾患死亡や生命予後の改善効果を期待でき、免疫原性からも接種が推奨されている^{12, 14)}。

CKD患者は腎障害だけでなく、高齢、免疫抑制薬使用、糖尿病・慢性呼吸器疾患・慢性心血管疾患の合併などの肺炎球菌性肺炎の予後不良因子を多数抱えていることがあり、その点からも肺炎球菌ワクチンの接種は必要であると考えられる。

米国では、50歳~64歳も肺炎球菌感染症のリスク因子を持つ人が多く、IPDの発症や入院のリスクが高いので、50歳以上にPCV20あるいはPCV15-PPSV23の連続接種が推奨された¹⁵⁾。19歳~49歳の慢性腎不全やネフローゼ症候群に対しても、PCV20あるいはPCV15-PPSV23の連続接種が推奨されている¹⁵⁾。

日本でも65歳以上にPCV20の1回接種あるいはPCV15接種後にPPSV23を接種する連続接種のいずれかが推奨されており¹⁶⁾、65歳未満のCKD患者にも同様の接種が推奨される。

ドイツにおいても年齢による接種対象は60歳以上となり、PCV20が推奨され、18歳以上の慢性腎不全及びネフローゼ症候群を含む免疫不全者もPCV20が推奨された¹⁷⁾。過去にPCV13/PCV15-PPSV23の連続接種またはPPSV23の接種を受けた者は、PPSV23接種6年後以降に、PCV20を接種することになった¹⁷⁾。

英国ではネフローゼ症候群、ステージ4及び5のCKD、透析患者、腎移植患者ではPPSV23の接種が推奨されており、未接種例にはPCV13またはPCV15を1回接種し、PPV23を

PCV 投与から 2 年後、少なくとも 8 週あけての接種を推奨している（当時、PCV20 は英国の予防接種プログラムに入っていたなかった）¹⁸。

国によってワクチンの接種法が微妙に異なるのは、ワクチンの承認状況、流行株の血清型の違い、ワクチンの接種率の低下、費用対効果、連続接種の有効性などについて国ごとに判断が異なるからである。

引用文献

1. Thomson D, *et al*. Chronic kidney disease and vaccinations-A practical guide for primary care providers. *J Natl Med Assoc* 2022;114(3s2):S20-s24. doi: 10.1016/j.jnma.2022.05.003
2. 正木崇生, 他 わが国の慢性透析療法の現況(2023 年 12 月 31 日現在). *日本透析医学会雑誌* 2024;57(12):543-620.
3. Ishigami J, *et al*. CKD and Risk for Hospitalization With Infection: The Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study. *Am J Kidney Dis* 2017;69(6):752-761. doi: 10.1053/j.ajkd.2016.09.018
4. Igari H, *et al*. Epidemiology and treatment outcome of pneumonia: analysis based on Japan national database. *J Infect Chemother* 2020;26(1):58-62. doi: 10.1016/j.jiac.2019.07.001
5. Viasus D, *et al*. Epidemiology, clinical features and outcomes of pneumonia in patients with chronic kidney disease. *Nephrol Dial Transplant* 2011;26(9):2899-2906. doi: 10.1093/ndt/gfq798
6. van Hoek AJ, *et al*. The effect of underlying clinical conditions on the risk of developing invasive pneumococcal disease in England. *J Infect* 2012;65(1):17-24. doi: 10.1016/j.jinf.2012.02.017
7. Liakou CD, *et al*. Safety, immunogenicity and kinetics of immune response to 7-valent pneumococcal conjugate vaccine in children with idiopathic nephrotic syndrome. *Vaccine* 2011;29(40):6834-6837. doi: 10.1016/j.vaccine.2011.07.053
8. Pittet LF, *et al*. Optimizing seroprotection against pneumococcus in children with nephrotic syndrome using the 13-valent pneumococcal conjugate vaccine. *Vaccine* 2016;34(41):4948-4954. doi: 10.1016/j.vaccine.2016.08.049
9. Vandecasteele SJ, *et al*. Immunogenicity and safety of the 13-valent Pneumococcal Conjugate vaccine in 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine-naïve and pre-immunized patients under treatment with chronic haemodialysis: a longitudinal quasi-experimental phase IV study. *Clin Microbiol Infect* 2018;24(1):65-71. doi: 10.1016/j.cmi.2017.05.016

10. Gilbertson DT, *et al*. The association of pneumococcal vaccination with hospitalization and mortality in hemodialysis patients. *Nephrol Dial Transplant* 2011;26(9):2934-2939. doi: 10.1093/ndt/gfq853
11. Bond TC, *et al*. Mortality of dialysis patients according to influenza and pneumococcal vaccination status. *Am J Kidney Dis* 2012;60(6):959-965. doi: 10.1053/j.ajkd.2012.04.018
12. Ihara H, *et al*. 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine improves survival in dialysis patients by preventing cardiac events. *Vaccine* 2019;37(43):6447-6453. doi: 10.1016/j.vaccine.2019.08.088
13. Le D, *et al*. Pneumococcal vaccination effectiveness (PCV13 and PPSV23) in individuals with and without reduced kidney function: a test-negative design study. *Clin Kidney J* 2024;17(6):sfae145. doi: 10.1093/ckj/sfae145
14. 日本腎臓学会. エビデンスに基づく CKD 診療ガイドライン 2018. <https://cdn.jsn.or.jp/data/CKD2018.pdf>. Accessed Aug 17, 2023.
15. Kobayashi M, *et al*. Expanded recommendations for use of pneumococcal conjugate vaccines among adults aged \geq 50 years: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices - United States, 2024. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2025;74(1):1-8. doi: 10.15585/mmwr.mm7401a1
16. 感染症・結核学術部会ワクチン WG／日本感染症学会ワクチン委員会／日本ワクチン学会・合同委員会 日. 65 歳以上の成人に対する肺炎球菌ワクチン接種に関する考え方 (第 6 版 2024 年 9 月 6 日)
https://www.kansensho.or.jp/uploads/files/guidelines/o65haienV/o65haienV_240930.pdf. Accessed Feb 18, 2025.
17. Robert Koch Institut. Epidemiologisches Bulletin 23 of January 2025 No4. https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/Epidemiologisches-Bulletin/2025/04_25.pdf?blob=publicationFile&v=4. Accessed Feb 20, 2025.
18. The Green book of immunisation: chapter 25 - pneumococcal. 23 of July 2023. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/64d68d6edd15ff000d278019/Green_Book_Chapter_25_Pneumococcal_27_7_23.pdf. Accessed Feb 20, 2025.

6. 慢性肝疾患

【病態の特徴】

肝臓は腸内細菌・ウイルスなど微生物の曝露を受けるため、高度な免疫能を備えた臓器である。慢性肝疾患、ことに肝硬変では網内系機能の低下、タンパク合成の低下など肝臓の機能低下に加え、免疫担当細胞全般にわたって免疫応答が障害される¹⁾。門脈圧亢進症を合併した場合微生物が肝臓を通ることなく全身に広がる。こうした免疫応答の障害は肝硬変のステージが進むほど強くなる。C型肝炎の患者では感染の原因の一つとして事故・手術などによる脾摘の際の輸血が挙げられる。こうした患者は莢膜を有する細菌の感染があった場合重症化する。また、血小板低下症に対する治療として Partial Splenic Embolization (PSE) を受ける患者は一般に進展した肝硬変を伴っている。

肝硬変患者が肺炎球菌感染症に罹患した場合、菌血症を伴いやすく敗血症性ショックになりやすいことが指摘されている²⁾。また、肺炎球菌は非代償性肝硬変患者の生命予後に大きな影響を及ぼす特発性細菌性腹膜炎の原因菌となることも報告されている³⁾。

【肺炎球菌感染症の発生頻度と予後】

日本の JMDC (Japan Medical Data Center) (2009~2014 年) からの解析によると、非侵襲性肺炎球菌性肺炎は 19~49 歳の年齢層で、基礎疾患のない症例の発生頻度 6.3 人/10 万人・年に対し、慢性肝疾患の症例では 24.3 人/10 万人・年 (相対リスク (RR) : 3.9)、50 ~64 歳の年齢層では、基礎疾患のない症例の発生頻度 : 11.5 人/10 万人・年に対し、慢性肝疾患の症例では 38.6 人/10 万人・年 (RR: 3.2) と報告されている⁴⁾。また、侵襲性肺炎球菌感染症 (IPD) は 19~49 歳の年齢層で、基礎疾患のない症例の発生頻度 : 0.3 人/10 万人・年に対し、慢性肝疾患の症例では 1.0 人/10 万人・年 (RR: 4.1)、50~64 歳の年齢層では、基礎疾患のない症例の発生頻度 : 1.6 人/10 万人・年に対し、慢性肝疾患の症例では 20.4 人/10 万人・年 (RR: 11.9) と報告されている⁴⁾。

米国の Healthcare claims repositories (2006~2010 年) からの解析によると、非侵襲性肺炎球菌性肺炎は 18~49 歳の年齢層で、基礎疾患のない症例の発生頻度 14 人/10 万人・年に対し、慢性肝疾患の症例では 90 人/10 万人・年 (RR: 6.4)、50~64 歳の年齢層では、基礎疾患のない症例の発生頻度 : 25 人/10 万人・年に対し、慢性肝疾患の症例では 148 人/10 万人・年 (RR: 5.8) と報告されている⁵⁾。また、IPD は 19~49 歳の年齢層では基礎疾患のない症例の発生頻度 1.8 人/10 万人・年に対し、慢性肝疾患の症例では 18.7 人/10 万人・年 (RR: 10.2)、50~64 歳の年齢層では、基礎疾患のない症例の発生頻度 : 4.5 人/10 万人・年に対し、慢性肝疾患の症例では 28.5 人/10 万人・年 (RR: 6.4) と報告されている⁵⁾。CDC からは 2013~2014 年の IPD の発生頻度が報告されており、19~64 歳の年齢層では、基礎疾患のない症例の発生頻度が 3.9 人/10 万人・年であったのに対し、慢性肝疾患の症例では 60.2 人/10 万人・年 (RR: 15.4) であった⁶⁾。

英国の GP records (2002 年~2009 年) からの解析によると、脾摘、脾機能不全、慢性

肺疾患、慢性心疾患、慢性腎疾患、慢性肝疾患、免疫抑制状態、人工内耳、髓液瘻の中で、IPD の発生リスクは慢性肝疾患の症例で最も高かった⁷⁾。2~15 歳の年齢層で、基礎疾患のない症例の発生頻度：3.9 人/10 万人・年に対し、慢性肝疾患の症例では 117 人/10 万人・年（オッズ比（OR）：29.6）、16~64 歳の年齢層では、基礎疾患のない症例の発生頻度 5.2 人/10 万人・年に対し、慢性肝疾患の症例では 172 人/10 万人・年（OR: 33.3）と報告されている。また、IPD の死亡リスクは 2~15 歳の年齢層で、基礎疾患のない症例の死亡率 1.8% に対し慢性肝疾患の症例の死亡率は 11.1%（OR: 7.0）、16~64 歳の年齢層では、基礎疾患のない症例の死亡率 5.4% に対し慢性肝疾患の症例の死亡率は 26.1%（OR: 10.3）であった⁷⁾。

オーストラリアのビクトリア州で実施された集団ベースのサーベイランス（2001~2017 年）によると C 型肝炎の症例は IPD 全体の 5.3% を占め、特に 45~49 歳の年齢層では IPD の 24.4% を占めていた⁸⁾。なお、C 型肝炎の症例において PCV13 の血清型による IPD は 55.3%、PPSV23 の血清型による IPD は 82.8% であった。年間の発生率は C 型肝炎以外の症例で 6.8 人/100,000 人・年に対し、C 型肝炎の症例は 39.4 人/10 万人・年（罹患率比（IRR）：5.8）であった⁸⁾。

これらの報告から、65 歳未満の慢性肝疾患を基礎疾患に有する症例の肺炎球菌感染症の発生リスク、死亡リスクはともに高く、肺炎球菌ワクチンによる予防が必要である。

【肺炎球菌ワクチンの免疫原性】

1) 肝硬変

肝硬変のなかでも臓器全体の機能に影響が及ぶのは主として Child-Pugh 分類で Grade B 以上の症例である。1980 年代に 15 例のアルコール性肝硬変群、10 例の COPD 群、10 例の健常者群、計 35 例を対象に、肺炎球菌莢膜多糖体ワクチンの免疫原性が評価されている⁹⁾。全例に 14 価肺炎球菌莢膜多糖体ワクチン（PPSV23 の前型）を接種し、接種前、接種 4 週後、12 週後の免疫反応（1 型、4 型、7F 型、8 型、18C 型に対する IgG、IgM、IgA を RIA を用いて測定）が比較された。その結果、ワクチン接種によってアルコール性肝硬変群でも健常者群と同等の抗体価の上昇が示された。また、アルコール性肝硬変群と健常者群で、ワクチン接種後の抗体価に有意な差は認められず、アルコール性肝硬変の症例に対しても莢膜多糖体型ワクチンで免疫が付与できることが示されている⁹⁾。

2) 肝移植

肝疾患の終末期には肝移植が治療の選択肢となる。肝移植待機者は末期肝不全による免疫低下状態であり、肝移植後は免疫抑制薬の使用によって免疫全般、ことに細胞性免疫が障害される。肝移植後の症例に関して、①ELISA を用いて PPSV23 の免疫原性（血清型特異的 IgG、IgM、IgA）を評価した 1 編の非ランダム化比較試験（non-RCT）¹⁰⁾、②ELISA とフローサイトメトリーを用いて PCV7/PPSV23 群と PPSV23 群の免疫原性（特異的 IgG 濃

度、OPA) を比較した 1 編の RCT¹¹⁾、③肝移植前に PPSV23 を接種した群と、肝移植前に PCV13、肝移植から 6 か月後に PCV13 を接種した群の免疫原性 (ELISA、OPA) を比較した RCT¹²⁾の計 3 報が報告されている。

① 45 例の肝移植群と 13 例のコントロール群、計 58 例を対象とした non-RCT では、全例に PPSV23 を接種し、3 型と 23 型の免疫応答 (ELISA を用いた IgG、IgM、IgA) が測定された。その結果、肝移植群で IgG は有意に低く、IgM と IgA は早期の減衰が確認された¹⁰⁾。

② 肝移植後の 113 例を対象とした RCT では、PCV7/PPSV23 群 (PCV7 を接種後、8 週間あけて PPSV23 を接種) と、PPSV23 群 (プラセボを接種後、8 週間あけて PPSV23 を接種) の 2 群で PCV7 含有血清型の特異的 IgG 濃度と OPA が比較されたが、特異的 IgG、OPA ともに両群で有意な差は認められず、同等であった¹¹⁾。

③ 17 例の肝移植前に PPSV23 を接種した群 (PPSV23 群) と 19 例の肝移植前に PCV13、肝移植から 6 か月後に PCV13 を接種した群 (PCV13/PCV13 群) を比較した計 36 例の RCT では、移植前の接種 1 か月後の時点で PCV13/PCV13 群の方が PPSV23 群よりも ELISA に関して 6A、7F、23F、OPA に関して 4、6A、6B、23F で有意な上昇を認めたが、肝移植から 6 か月後には両群ともにワクチン効果はベースラインまで減衰し、カットオフ値 (ELISA cut-off $\geq 1.0 \mu\text{g/mL}$, OPA ≥ 8) を超えた症例の割合は同等であった¹²⁾。なお、PCV13/PCV13 群では肝移植から 6 か月後に PCV13 を接種することで、接種 1 か月後には免疫原性が回復したことが報告されている。

【ワクチン予防効果】

現在のところ慢性肝疾患の症例を対象とした肺炎球菌ワクチンの予防効果は報告されていない。

【肺炎球菌ワクチンの接種推奨の要点】

- 1) 65 歳未満において、慢性肝疾患、特に肝硬変の症例は肺炎球菌感染症の発症頻度、死亡率が高いため、ハイリスク者として PCV20 の単回接種または PCV15-PPSV23 による連続接種を検討することが望ましい。
- 2) 肝移植患者は免疫抑制状態の症例に分類され、PCV20 の単回接種または PCV15-PPSV23 による連続接種が推奨される¹³⁾。
- 3) 現在のところ慢性肝疾患 (肝移植患者を含む) を対象とした PCV20 の単回接種または PCV15-PPSV23 の連続接種の PPSV23 単回接種に対する有意な免疫原性、臨床的な予防効果は報告されておらず、今後の検討が必要である。

引用文献

1. Albillos A, *et al*. Cirrhosis-associated immune dysfunction: distinctive features and clinical relevance. *J Hepatol* 2014;61(6):1385-1396. doi: 10.1016/j.jhep.2014.08.010
2. Viasus D, *et al*. Community-acquired pneumonia in patients with liver cirrhosis: clinical features, outcomes, and usefulness of severity scores. *Medicine (Baltimore)* 2011;90(2):110-118. doi: 10.1097/MD.0b013e318210504c
3. Kim T, *et al*. Clinical features and outcomes of spontaneous bacterial peritonitis caused by *streptococcus pneumoniae*: a matched case-control study. *Medicine (Baltimore)* 2016;95(22):e3796. doi: 10.1097/md.0000000000003796
4. Imai K, *et al*. Risk of pneumococcal diseases in adults with underlying medical conditions: a retrospective, cohort study using two Japanese healthcare databases. *BMJ Open* 2018;8(3):e018553. doi: 10.1136/bmjopen-2017-018553
5. Shea KM, *et al*. Rates of pneumococcal disease in adults with chronic medical conditions. *Open Forum Infect Dis* 2014;1(1):ofu024. doi: 10.1093/ofid/ofu024
6. Ahmed SS, *et al*. Early impact of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine use on invasive pneumococcal disease among adults with and without underlying medical conditions-United States. *Clin Infect Dis* 2020;70(12):2484-2492. doi: 10.1093/cid/ciz739
7. van Hoek AJ, *et al*. The effect of underlying clinical conditions on the risk of developing invasive pneumococcal disease in England. *J Infect* 2012;65(1):17-24. doi: 10.1016/j.jinf.2012.02.017
8. Gibney KB, *et al*. Incidence of invasive pneumococcal disease higher among people notified with markers of hepatitis C virus infection: population-based surveillance in victoria, Australia, 2001-2017. *Clin Infect Dis* 2021;72(9):e319-e325. doi: 10.1093/cid/ciaa1110
9. Pirovino M, *et al*. Pneumococcal vaccination: the response of patients with alcoholic liver cirrhosis. *Hepatology* 1984;4(5):946-949. doi: 10.1002/hep.1840040527
10. McCashland TM, *et al*. Pneumococcal vaccine response in cirrhosis and liver transplantation. *J Infect Dis* 2000;181(2):757-760. doi: 10.1086/315245
11. Kumar D, *et al*. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial to evaluate the prime-boost strategy for pneumococcal vaccination in adult liver transplant recipients. *Clin Infect Dis* 2008;47(7):885-892. doi: 10.1086/591537
12. Eriksson M, *et al*. A randomized, controlled trial comparing the immunogenicity and safety of a 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccination to a repeated dose 13-valent pneumococcal conjugate vaccination in adult liver transplant recipients. *Vaccine* 2021;39(17):2351-2359. doi: 10.1016/j.vaccine.2021.03.063

13. Kobayashi M, et al. Pneumococcal vaccine for adults aged ≥ 19 years: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices, United States, 2023. MMWR Recomm Rep 2023;72(3):1-39. doi: 10.15585/mmwr.rr7203a1

7. 糖尿病

【病態の特徴】

糖尿病患者では、高血糖に伴う好中球やマクロファージ機能の低下、血管内皮機能や凝固異常、神経障害、栄養障害など多くの因子が易感染性に関わっている。また重症感染症においては、炎症性サイトカインやインスリン拮抗ホルモンの上昇によって、インスリン抵抗性が増強、高血糖が増悪し、さらに感染症が重症化する。

カナダにおいて実施された糖尿病患者と非糖尿病患者各513,749例を比較した後方視的コホート研究では、糖尿病患者の感染発症リスクは1.21倍で、感染症関連の入院リスクは2.17倍、感染症による死亡リスクは1.92倍であった¹⁾。オーストラリアにおいて実施された糖尿病患者1,294例と非糖尿病患者各5,156例を比較した観察研究（平均12年間）では、糖尿病患者の感染症関連入院の独立したリスク因子が高齢、男性、感染症関連入院の既往、肥満、アルブミン尿、網膜症、先住民であった²⁾。その他、多くの大規模研究で糖尿病患者は非糖尿病患者と比較してさまざまなリスク（感染症発症、入院、重症化、死亡など）が上昇することが判明している。

【肺炎球菌感染症の発生頻度と予後】

日本糖尿病学会によるわが国の糖尿病患者の死因に関するアンケート調査（2011～2020年、68,555例）では、感染症による死亡は第2位（17.0% vs 非糖尿病 14.5%, p<0.001）で、中でも肺炎の頻度が最も高く11.4%（vs 非糖尿病 14.5%, p<0.001）、結核0.1%、その他5.4%であった³⁾。

糖尿病患者における市中肺炎発症のリスクは、コホート研究でハザード比（HR）1.0～1.9、rate ratio 1.6～3.1、症例・対照研究でオッズ比（OR）1.0～1.4、HR 1.1と報告されている⁴⁻⁶⁾。

わが国の市中肺炎ならびに医療・介護関連肺炎の原因微生物で最も頻度の高いのは肺炎球菌であるが、オーストラリアの糖尿病患者における菌血症を伴う肺炎球菌性肺炎発症のリスクは、補正相対リスク（RR）が2.3（95%信頼区間（CI）1.55-2.65）と報告されている⁷⁾。年齢別に検討した後方視的コホート研究では、英国でrate ratiosが60歳未満で2.03（95%CI 1.55-2.65）、60歳以上で1.54（95%CI 1.32-1.79）の報告⁴⁾と、米国でrate ratioが18～49歳で3.1（95%CI 2.9-3.3）、50～64歳で3.0（95%CI 2.6-3.1）、65歳以上で2.8（95%CI 2.7-2.9）との報告がある⁵⁾。

糖尿病患者における侵襲性肺炎球菌感染症(IPD)の発症リスクを検討した研究を以下にまとめた。

- ① 米国の18歳以上を対象とした集団ベースのサーベイランス研究で補正OR 1.4 (95%CI 1.0-2.0)⁸⁾
- ② スウェーデンの18歳以上を対象とした症例・対象研究でOR 1.7 (95%CI 1.5-1.9)⁹⁾
- ③ 英国の後方視的コホート研究でrate ratiosが60歳未満で2.06 (95%CI 1.33-3.14)、60歳以上で1.50 (95%CI 1.12-2.01)⁴⁾
- ④ 米国の後方視的コホート研究でrate ratiosが18~49歳で3.0 (95%CI 2.4-3.7)、50~64歳で2.6 (95%CI 2.3-2.9)、65歳以上で2.5 (95%CI 2.2-2.9)⁵⁾
- ⑤ IPDで入院した患者におけるリスク因子の疫学検討ではORが16~64歳で4.6 (95%CI 4.2-5.0)、65歳以上で2.3 (95%CI 2.2-2.5)¹⁰⁾
- ⑥ 米国の18歳以上を対象とした症例・対象前方視研究でORが単変量解析で1.7 (95%CI 1.0-2.9)、多変量解析で1.5 (95%CI 0.8-2.6)¹¹⁾
- ⑦ 英国の2つの後方視的コホート研究でrate ratioがOxford Record Linkage Study 2で3.30 (95%CI 2.07-5.07)、英国で3.90 (95%CI 3.55-4.28)¹²⁾
- ⑧ 米国の後方視的コホート研究でrate ratiosが18歳未満で2.3 (95%CI 0.9-5.5)、18~64歳で3.5 (95%CI 3.2-3.9)、65歳以上で2.5 (95%CI 2.2-2.9)¹³⁾
- ⑨ 血糖コントロール不良の場合、肺炎球菌性肺炎による入院が増加する¹⁴⁾。

【肺炎球菌ワクチンの免疫原性】

糖尿病患者を対象とした肺炎球菌ワクチンの免疫原性を評価した研究は、きわめて限られている。PPSV23に関しては唯一、わが国の高齢者糖尿病患者で抗体濃度の推移を検討した報告がある¹⁵⁾。13人のPPSV23接種前後の肺炎球菌莢膜特異的IgG濃度の変化を同時期のPPSV23非接種者と比較したところ、検討した14種類(1、3、4、5、6B、7F、8、9N、9V、12F、14、18C、19F、23F)すべての血清型に対してワクチン接種後に有意な特異的IgG濃度の上昇がみられた。

PCV13接種1か月後の基礎疾患別の血清型特異的IgGおよびOPAの幾何学的平均値(GMT)を検討した研究では、糖尿病患者を含め健常者、心疾患患者、呼吸器疾患患者、喘息患者、2つ以上の基礎疾患保有患者など、すべての対象者において13の血清型(1、3、4、5、6A、6B、7F、9V、14、18C、19A、19F、23F)の有意な抗体濃度上昇がみられた¹⁶⁾。たとえば血清型1では、ワクチン接種前のOPA GMTが10 (95%CI 9.5-11.5)に対し1か月後には91 (95%CI 68.4-121.4)、12か月後には30 (95%CI 23.6-38.6)、24か月後には19 (95%CI 15.7-23.7)と、健常者と同じ値で推移していた。

PCV15接種後1か月後のリスク因子のある18~49歳成人を対象に血清型特異的IgGの幾何平均抗体濃度(GMC)およびOPAの幾何平均抗体値(GMT)を検討した研究では、糖尿病患者を含め喫煙者、アルコール多飲者、慢性肺疾患患者、慢性心疾患患者、慢性肝疾患

患者、2つ以上のリスク因子保有者など、すべての対象者において15の血清型（1、3、4、5、6A、6B、7F、9V、14、18C、19A、19F、22F、23F、33F）の有意な抗体濃度上昇がみられた¹⁷⁾。本研究では、6か月間隔でのPCV15-PPSV23連続接種の免疫原性も検討しており、PPSV23接種1か月後に15血清型のIgG GMCおよびOPA GMTの上昇が確認されている。

60歳以上の罹患リスク保有者（糖尿病が25%）を対象としたPCV20とPCV13/PPSV23の比較試験では、1か月後のOPA GMTは大幅な上昇が認められ、13共通血清型に対するOPA幾何平均上昇倍率（GMFR）は、PCV20群とPCV13/PPSV23群とで概ね同様で、7追加血清型に対するOPA GMFRは、血清型8を除きPCV20群がPCV13/PPSV23群より高い傾向であった¹⁸⁾。血清型8に対するPCV20群のOPA GMFRは罹患リスクを有する集団で18.1、罹患リスクなしの集団で17.7であり、罹患リスクの有無に関わらず、PCV13/PPSV23群における全血清型に対するOPA GMFRの範囲内であった。

【ワクチンの予防効果】

イタリアのロンバルディア州医療システムデータベースから、糖尿病患者618,396人および非糖尿病被験者9,534,087人を対象に、肺炎球菌ワクチンの効果を検討した報告では、糖尿病患者における死亡率、全入院および心肺関連入院で、ワクチン未接種群と比較してワクチン接種群での改善は認められず、入院率に関してはワクチン接種群でわずかに増加した¹⁹⁾。肺炎球菌ワクチンの有効性が低い理由として、肺疾患のheterogeneityと、高齢者層でのワクチン接種率が相対的に低かったためと考えられる。

肺炎球菌疾患の発症と関連合併症のリスク因子としての糖尿病の影響、および糖尿病患者におけるワクチンの有効性／有用性に関しての10件の観察研究のメタ解析（8件がPPSV23、1件がPCV13、1件は両ワクチンを含む）では、糖尿病患者はIPD、死亡率、肺炎球菌性肺炎、および肺炎球菌性疾患によるICU入室のリスクが高かった²⁰⁾。また、糖尿病患者でのPCV接種群は非接種群に比べ、臨床試験ではワクチン含有血清型による肺炎の発生率が、観察研究ではワクチン接種後1年間の全肺炎による入院率が有意に低く、その他の指標では有意差は認められなかった。

成人糖尿病患者における入院および全死亡リスクに対する肺炎球菌ワクチン接種の影響を検討した系統的レビューでは、2,738試験から2試験が採用され、両試験共にPPSV23接種は成人糖尿病患者の入院または死亡のリスク低下と関連していたが統計学的に有意ではなかった²¹⁾。

【肺炎球菌ワクチンの接種推奨の要点】

- ・ わが国における高齢者を対象とした研究においてPPSV23接種による肺炎球菌性肺炎およびIPDの予防効果が示されている^{22, 23)}。一方、糖尿病患者においては上述のとおり肺炎球菌ワクチンの効果に関する一定の見解が得られていない。
- ・ しかしながら、糖尿病の存在によって市中肺炎発症リスク、肺炎球菌性肺炎発症リスク、

IPD リスクが上昇することが複数の研究から示唆されている。また、糖尿病患者における PPSV23 および PCV13/PCV15/PCV20 接種による特異抗体価の上昇が実証されていることから、糖尿病患者を対象とした肺炎球菌ワクチン接種による肺炎発症抑制効果が期待される。

- ・ 65 歳未満の糖尿病患者に対して PCV20 単回接種および PCV15-PPSV23 の連続接種 も選択肢と考えられる。
- ・ 糖尿病患者における肺炎球菌ワクチン接種の推奨年代に関しては今後の研究結果が待たれるところである。

引用文献

1. Shah BR, *et al.* Quantifying the risk of infectious diseases for people with diabetes. *Diabetes Care* 2003;26(2):510-513. doi: 10.2337/diacare.26.2.510
2. Hamilton EJ, *et al.* Incidence and predictors of hospitalization for bacterial infection in community-based patients with type 2 diabetes: the fremantle diabetes study. *PLoS One* 2013;8(3):e60502. doi: 10.1371/journal.pone.0060502
3. 中村二郎, 他. アンケート調査による日本人糖尿病の死因 2011～2020 年の 10 年間,68,555 名での検討. *糖尿病* 2024;67(2):106-128
4. Seminog OO, *et al.* Risk of pneumonia and pneumococcal disease in people hospitalized with diabetes mellitus: English record-linkage studies. *Diabet Med* 2013;30(12):1412-1419. doi: 10.1111/dme.12260
5. Shea KM, *et al.* Rates of pneumococcal disease in adults with chronic medical conditions. *Open Forum Infect Dis* 2014;1(1):ofu024. doi: 10.1093/ofid/ofu024
6. Vinogradova Y, *et al.* Identification of new risk factors for pneumonia: population-based case-control study. *Br J Gen Pract* 2009;59(567):e329-338. doi: 10.3399/bjgp09X472629
7. Jacups SP, *et al.* The epidemiology of community acquired bacteraemic pneumonia, due to *Streptococcus pneumoniae*, in the Top End of the Northern Territory, Australia--over 22 years. *Vaccine* 2011;29(33):5386-5392. doi: 10.1016/j.vaccine.2011.05.082
8. Flory JH, *et al.* Socioeconomic risk factors for bacteraemic pneumococcal pneumonia in adults. *Epidemiol Infect* 2009;137(5):717-726. doi: 10.1017/s0950268808001489
9. Inghammar M, *et al.* Invasive pneumococcal disease in patients with an underlying pulmonary disorder. *Clin Microbiol Infect* 2013;19(12):1148-1154. doi: 10.1111/1469-0691.12182
10. van Hoek AJ, *et al.* The effect of underlying clinical conditions on the risk of developing invasive pneumococcal disease in England. *J Infect* 2012;65(1):17-24. doi: 10.1016/j.jinf.2012.02.017

11. Watt JP, *et al*. Risk factors for invasive pneumococcal disease among Navajo adults. *Am J Epidemiol* 2007;166(9):1080-1087. doi: 10.1093/aje/kwm178
12. Wotton CJ, *et al*. Risk of invasive pneumococcal disease in people admitted to hospital with selected immune-mediated diseases: record linkage cohort analyses. *J Epidemiol Community Health* 2012;66(12):1177-1181. doi: 10.1136/jech-2011-200168
13. Weycker D, *et al*. Rates and costs of invasive pneumococcal disease and pneumonia in persons with underlying medical conditions. *BMC Health Serv Res* 2016;16:182. doi: 10.1186/s12913-016-1432-4
14. Rueda AM, *et al*. Hyperglycemia in diabetics and non-diabetics: effect on the risk for and severity of pneumococcal pneumonia. *J Infect* 2010;60(2):99-105. doi: 10.1016/j.jinf.2009.12.003
15. 小島原典子, 他. 高齢糖尿病患者における肺炎球菌ワクチン接種による抗体濃度の推移. *感染症学雑誌* 2007;81(5):602-606. doi: 10.11150/kansenshogakuzassi1970.81.602
16. van Deursen AMM, *et al*. Immunogenicity of the 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine in Older Adults With and Without Comorbidities in the Community-Acquired Pneumonia Immunization Trial in Adults (CAPiTA). *Clin Infect Dis* 2017;65(5):787-795. doi: 10.1093/cid/cix419
17. Hammitt LL, *et al*. Phase 3 trial to evaluate the safety, tolerability, and immunogenicity of V114, a 15-valent pneumococcal conjugate vaccine, followed by 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine 6 months later, in at-risk adults 18-49 years of age (PNEU-DAY): A subgroup analysis by baseline risk factors. *Hum Vaccin Immunother* 2023;19(1):2177066. doi: 10.1080/21645515.2023.2177066
18. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構. プレベナー20 水性懸濁注 審査報告書. https://www.pmda.go.jp/drugs/2024/P20240829003/672212000_30600AMX00115_A100_2.pdf. Accessed Jan 30, 2025.
19. D'Addio F, *et al*. Vaccinome landscape in nearly 620,000 patients with diabetes. *J Clin Endocrinol Metab* 2024. doi: 10.1210/clinem/dgae476
20. Silverii GA, *et al*. Diabetes as a risk factor for pneumococcal disease and severe related outcomes and efficacy/effectiveness of vaccination in diabetic population. Results from meta-analysis of observational studies. *Acta Diabetol* 2024;61(8):1029-1039. doi: 10.1007/s00592-024-02282-5
21. Del Riccio M, *et al*. Effectiveness of pneumococcal vaccination on hospitalization and death in the adult and older adult diabetic population: a systematic review. *Expert Rev Vaccines* 2023;22(1):1179-1184. doi: 10.1080/14760584.2023.2286374
22. Suzuki M, *et al*. Serotype-specific effectiveness of 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine against pneumococcal pneumonia in adults aged 65 years or

- older: a multicentre, prospective, test-negative design study. *Lancet Infect Dis* 2017;17(3):313-321. doi: 10.1016/s1473-3099(17)30049-x
23. Shimbashi R, et al. Effectiveness of 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine against invasive pneumococcal disease in adults, Japan, 2013-2017. *Emerg Infect Dis* 2020;26(10):2378-2386. doi: 10.3201/eid2610.191531

8. 自己免疫性疾患

【病態の特徴】

関節リウマチ (rheumatoid arthritis, RA) は、複数の遺伝的要因と環境要因が発症に関与している自己免疫疾患の一つであり、国内の患者数は 70~90 万人と推計されている。関節リウマチは 40-60 歳台が発症のピークがあるのに対して、他の膠原病では発症年齢は相対的に低い (全身性エリテマトーデス (systemic lupus erythematosus, SLE) 20-30 代、多発性筋炎/皮膚筋炎 40-50 代、強皮症 30-50 代)^{1, 2)}。RA では手指関節をはじめとして多関節に滑膜炎を来たし、無治療の場合は関節破壊・変形をきたす。関節外症状として間質性肺炎や血管炎に伴う臓器病変を認めることもある。血液検査では、炎症反応の上昇に加え、RA に特異的な抗 CCP 抗体が検出される事が多い。RA の診断は関節症状・所見に加え、これら検査値異常などの項目からなるアメリカリウマチ学会/ヨーロッパリウマチ学会 (ACR/EULAR) の RA 分類基準でなされ、RA の活発性評価には DAS-28 などの複合的指標が用いられる。

RA の治療は目標達成に向けた治療 (Treat-to-Target: T2T) の考えに基づいて、1~3 か月ごとに RA の疾患活動性を評価し、寛解あるいは低疾患活動性を目標にして、主に日本リウマチ学会の治療ガイドラインに準じて行われる。まず治療の最初の段階 (フェーズ 1) ではメトトレキサート (MTX) に代表される従来型合成抗リウマチ薬 (csDMARDs) で治療を開始する。治療目的を達成できない場合は次の段階として (フェーズ 2)、生物学的製剤 (bDMARDs)、あるいは分子標的型合成抗リウマチ薬 (tsDMARDs) である JAK 阻害薬を用いて治療を行うことが推奨されている³⁾。

【肺炎球菌感染症の発生頻度と予後】

自己免疫疾患においては疾患自体の免疫異常ならびに使用中の免疫抑制薬の影響のため様々な感染症のリスクが高く、予防可能な感染症に対するワクチン接種が推奨されている。特に肺炎球菌性肺炎および侵襲性肺炎球菌感染症 (IPD) は一般人口と比較しての発症率が高く¹⁾、肺炎球菌ワクチンの接種が推奨されている。米国の診療レセプトデータを用いた報告では肺炎球菌性肺炎の罹患率比 (IRR) は健常人と比較して RA、SLE でそれぞれ 4.4、4.3 と高値であった⁴⁾。オランダの SLE 患者における研究では一般人口と比較して IPD の発症率が 13 倍高いと報告されている⁵⁾。また SLE 患者における同様の検討では、一般

人口と比較して肺炎球菌関連感染症に関連した死亡率が高かった⁶⁾。

【肺炎球菌ワクチンの免疫原性】

自己免疫疾患患者に対するワクチン接種の際には、疾患自体の免疫異常と使用中の免疫抑制療法によるワクチンの免疫原性に対する影響に注意が必要である。理想的には自己免疫疾患患者に対するワクチン接種は免疫抑制療法の開始前に行われることが望ましいとされている⁷⁾。特に rituximab (RTX)による B 細胞除去療法に関してはワクチン接種による抗体価の上昇を強力に抑制するとされており、ワクチン接種時期を慎重に決定すべきである⁵⁾。しかし原疾患の症状が強い場合、ワクチン接種の施行のために免疫抑制療法が遅れるべきではないとされており⁷⁾、実臨床では原疾患の症状が強く免疫抑制療法をワクチン接種前に行わなければならず、免疫抑制薬投与下にワクチン接種を行うケースも多く、そのような場合でもワクチン接種による細胞性免疫への賦活効果は維持されることがある。実地臨床家は免疫抑制薬によるワクチンの免疫原性への影響を熟知している必要がある。

PPSV23 の免疫原性に関しては、RA や SLE の報告で十分な免疫応答が報告されている⁸⁾。また、自己免疫疾患における各免疫抑制薬による PPSV23 の免疫原性に対する影響も多くの検討がなされている。2019 年に systematic literature review⁹⁾が行われており、少量から中等量のグルココルチコイド (GC ; プレドニゾロン換算 20mg/日以下) や TNF 阻害剤、抗 IL-6 受容体抗体である tocilizumab (TCZ) は PPSV23 の免疫原性への影響は少ないとし、メトトレキサート (MTX) は PPSV23 の免疫原性を減弱するとしている。また T 細胞活性化阻害剤である abatacept (ABT) は免疫原性を軽度減弱させる可能性があるとされている。また近年使用頻度が増えている JAK 阻害剤 (tofacitinib) に関しては、RA 患者に対して tofacitinib 20mg/日を投与開始 4 週間経過した時点で PPSV23 を接種し、PPSV23 接種 5 週間後に 12 種類の肺炎球菌血清型に対する特異的 IgG 抗体価が評価されているが、十分な効果 (6 種類以上の血清型について 2 倍以上の抗体価の上昇) がみられた割合は tofacitinib 投与群では 45% (tofacitinib 非投与群 68.4%) と低く、特に MTX 併用群では 31.6% とその傾向が顕著であったと報告されている¹⁰⁾。さらに、自己免疫疾患患者への PPSV23 の接種において、5 年以内の再接種の場合や MTX 投与中の場合には有意な抗体価が得られていないとする報告もみられる¹¹⁾。

一方、单施設で実施された後ろ向きコホート研究であるが、PPSV23 接種歴のある炎症性関節炎患者 (74% が RA 患者) の長期的な免疫原性を評価し、PPSV23 接種から免疫原性評価までの期間を 5 年以下、5~10 年、10 年以上に分類し、抗体価の持続性を評価した結果、時間の経過に伴う抗体価の低下は認められなかつたと報告されている¹²⁾。なお、PPSV23 が 16 試験、PCV13 が 2 試験、PCV7 が 1 試験、PCV13+PPSV23 が 1 試験の合計 20 編が解析された最近のメタアナリシスで、ABT、TCZ、TNF 阻害剤、JAK 阻害剤の単回療法が免疫原性を減少させるという所見は示されていないが、MTX (単剤/併用) と RTX は免疫原性を低下させることも報告された¹³⁾。

PCV13 の免疫原性に関しても十分な免疫応答が報告されている¹⁴⁾。免疫抑制薬の PCV13 の免疫原性への影響は PPSV23 と比較して少數であるが検討されている。MTX が使用されている RA 患者において PCV13 接種 4 週間後に 2 つの莢膜多糖体抗原 (6B、23F) に対する抗体価が検討されているが、十分な抗体価の上昇 (接種前の抗体価と比較して 2 倍以上の上昇) がみられた患者の割合は 10% (MTX 未投与群 40%) であった¹⁵⁾。また別の検討では、TNF 阻害剤による PCV13 の免疫原性に対する影響は少ないとされている¹⁶⁾。ABT、TCZ 投与中の RA 患者における検討では、TCZ ではコントロール群 (NSAIDs が使用されている脊椎関節炎患者) と比較して同等の抗体価の増加を認めたのに対して、ABT 投与下では抗体価の上昇が減弱している¹⁷⁾。また JAK 阻害剤に関しては baricitinib 投与中の RA 患者 (89% の症例が MTX を併用されている) の検討では 68% の症例で PCV13 接種 5 週間後十分な反応がみられたとされている¹⁸⁾。また tofacitinib 投与中の乾癬性関節炎の患者の検討では十分な抗体価の上昇がみられている¹⁹⁾。最近では国内から、JAK 阻害剤、MTX、JAK 阻害剤と MTX の両方を使用している患者において、抗体陽性率がそれぞれ 95%、90%、52.2% であり、JAK 阻害剤と MTX の併用群では有意に抗体価の上昇が阻害されたことが報告された²⁰⁾。さらに upadacitinib (JAK 阻害剤) と MTX を併用している RA 患者における PCV13 の免疫原性を評価した第Ⅱ相非盲検延長試験で upadacitinib 15 mg 群の 67.5% および upadacitinib 30mg 群の 56.5% の患者で十分な免疫原性が得られ、44.1% の患者で併用されていた GC による影響は認められなかった²¹⁾。

PCV15 の安全性と免疫原性を比較した第 III 相、多施設プラセボ対照二重盲検比較試験²²⁾では、自己免疫疾患の患者は含まれておらず、今後の国内外での自己免疫疾患患者での免疫原性のデータの蓄積が待たれる。

近年 PCV13-PPSV23 の連続接種がさまざまな免疫不全患者に推奨されているが、一般集団や HIV 患者を対象にした検討を基にしたエキスパートオピニオンであり、自己免疫疾患における連続接種のエビデンスは不十分である。しかし 2017 年の報告では csDMARDs (MTX 投与例が 91%)、bDMARDs (RTX、TNF 阻害剤、IL-6 受容体拮抗薬、ABT を含む) を使用中の RA 患者に PCV13-PPSV23 の連続接種を行い 4 週間後の 12 の莢膜多糖類抗原 (1、3、4、5、6B、7F、9V、14、18C、19A、19F、23F) に対する抗体価を評価しているが、それぞれ 87% と 94% の患者で十分な反応 (6 つ以上の抗原に対する抗体価がベースラインから 4 倍以上の上昇もしくは 0.35 mg/L 以上に上昇) がみられたとしている²³⁾。さらに 2020 年には、RTX、ABT、csDMARDs 使用中の RA 患者において PCV-PPSV23 連続接種群と PCV 単独接種群の接種 4~8 週間後の抗体価の評価が行われ、PCV 単独接種群と比較して連続接種群の場合、ABT、csDMARDs、コントール群では十分に抗体価が上昇した抗原数が有意に多かったとされ自己免疫疾患における連続接種の有効性が示されている²⁴⁾。また、18 歳以上の自己免疫疾患患者における PCV13-PPSV23 連続接種 4 週後の共通血清型に対する OPA を評価し、使用薬剤別、疾患別で見た結果、全体のほぼ 50% において十分な機能的抗体を獲得していたと報告された²⁵⁾。

一方で RA や乾癬などを含む免疫抑制薬が投与されている患者での PCV13-PPSV23 の通常の連続接種では 12 か月後の抗体価低下が顕著であるため、PCV13 の用量追加やさらに広い血清型を含むワクチンの必要性を示唆する報告²⁶⁾や SLE 患者の PCV13-PPSV23 の連続接種では PPSV23-PCV13 の連続接種に比べてより高い抗体価が得られたとする報告もみられた²⁷⁾。SLE 患者における PCV13-PPSV23 連続接種 36 か月後までの免疫原性を評価し、接種後 36 か月で一定基準の免疫応答を示したのは 21 人中 10 人であり、11 人は長期の免疫応答が認められず、肺炎球菌ワクチンの連続接種による SLE 患者の免疫的な効果は不十分だったとする報告²⁸⁾や、RA 患者における PCV13-PPSV23 連続接種 24 か月後までの共通血清型、PPSV23 固有の血清型に対する免疫原性 (IgG、OPA) を評価し、IgGにおいては 4 か月後、12 か月後、24 か月後で同程度の抗体獲得率が認められたが、OPA では接種後 24 か月後には減少していたとする報告もある²⁹⁾。肺炎球菌ワクチンの連続接種によって短期的には良好な予防効果をもたらすが、この予防効果は 2 年以上持続せず、機能的抗体のレベルは接種前のレベル以下に低下する可能性も示唆された。

なお、2022 年 1 月に米国 CDC は 65 歳以上の全ての成人に加えて、PCV を未接種あるいは接種歴が不明な 19~64 歳の慢性疾患のある成人に対して、PCV15-PPSV23 の連続接種または PCV20 の接種を推奨した³⁰⁾。PCV20 の臨床試験では自己免疫性疾患を有する患者のエントリーは確認されていないが^{31, 32)}、対象疾患には長期間の GC 効果を含む免疫抑制療法が必要な疾患も含まれている。さらに米国 CDC は今後接種年齢を 50 歳に引き下げるなどを提案した上で、自己免疫性疾患を含めたハイリスク患者に対して PCV20 および PCV21 (日本未承認) を主に推奨するとした³³⁾。

また、最近国内から報告された 65 歳以上を対象とした PCV13-PPSV23 の連続接種の間隔が半年と 1 年の場合の比較研究では、副反応の頻度には差はなく、半年より 1 年の接種間隔のほうがより高いブースター効果を獲得できることが示されている³⁴⁾。

一方で米国では、免疫抑制薬が必要な自己免疫疾患を含むハイリスク患者は PCV13 接種後 8 週以後の PPSV23 接種が推奨されており³⁰⁾、感染リスクを考慮して PCV15 接種後 1 年以内の PPSV23 接種を検討することも考えられる。

今後本邦でも自己免疫疾患における PCV20 単回接種と PCV15-PPSV23 連続接種のエビデンスの構築が必要である。

【ワクチン予防効果】

自己免疫疾患におけるワクチン接種の効果は、抗体価の上昇や抗体の OPA で評価されることが多く、自己免疫疾患で PPSV23 と PCV13 の臨床的な肺炎球菌性肺炎に対する予防効果を示したランダム化比較試験 (RCT) はみられない。しかし MTX 投与中の RA 患者における長期的な臨床効果を検討した観察研究では、PPSV23 接種群と比較して非接種群では肺炎発症の相対リスクは 9.7 と高かった³⁵⁾。またスウェーデンからの観察研究では、RA または脊椎関節症患者に PCV7 を接種することで観察期間中の肺炎球菌性肺炎を含む重篤

な感染症の相対リスクが約 45% 減少したとしている³⁶⁾。さらに、PCV7 を 1 回だけ接種された RA もしくは乾癬性関節炎患者を 10 年間観察したところ、重篤な肺炎球菌感染症発症の相対リスクは 45% 減少し、その有効性は 10 年間変わらなかったとする報告もみられる³⁷⁾。

米国の在郷軍人病院での 33,545 人の RA 患者を対象とした後ろ向きコホート研究では、ワクチン未接種者は疾患コードによる IPD でオッズ比 2.42 倍、微生物検査で確認した IPD でオッズ比 1.64 倍の相関がみられた³⁸⁾。同じく 39,243 人の RA 患者において、肺炎球菌ワクチン受け入れ率は 43.9 % で、人種差や婚姻率、心不全や認知症の有無で差が見られた。ワクチン非受け入れ患者のうちワクチン未接種者は 32.1%、ワクチン未接種者の 65.3 % はワクチン非受け入れ患者であり、ワクチンに対する理解と実際のワクチン接種行動の重要性が示唆された³⁹⁾。

今後 PCV15 や PCV20 に関しても自己免疫疾患でのエビデンスが待たれる。

【肺炎球菌ワクチンの接種推奨の要点】

- 1) 免疫抑制薬投与中の 65 歳以下の自己免疫疾患患者に対しては PPSV23 の接種が望ましい。また、免疫抑制薬投与中の 65 歳以下の自己免疫疾患患者に対しては PCV15-PPSV23 の連続接種も選択肢として考えられる。
- 2) 連続接種の場合の接種間隔は原則 1 年が望ましいが、その感染リスクを考慮して PCV15 接種後 1 年以内の PPSV23 接種を検討することも考えられる。
- 3) 免疫抑制薬が肺炎球菌ワクチンの免疫原性を減弱する可能性に注意が必要である。
- 4) PCV20 の成人への適応が承認されており、免疫抑制薬を使用している自己免疫性疾患患者への効果が期待される。

引用文献

1. Ohta A, et al. Age at onset and gender distribution of systemic lupus erythematosus, polymyositis/dermatomyositis, and systemic sclerosis in Japan. *Mod Rheumatol* 2013;23(4):759-764. doi: 10.1007/s10165-012-0733-7
2. Kojima M, et al. Epidemiological characteristics of rheumatoid arthritis in Japan: Prevalence estimates using a nationwide population-based questionnaire survey. *Mod Rheumatol* 2020;30(6):941-947. doi: 10.1080/14397595.2019.1682776
3. Kawahito Y, et al. Drug treatment algorithm and recommendations from the 2020 update of the Japan College of Rheumatology clinical practice guidelines for the management of rheumatoid arthritis-secondary publication. *Mod Rheumatol* 2023;33(1):21-35. doi: 10.1093/mr/roac017
4. Shea KM, et al. Rates of pneumococcal disease in adults with chronic medical conditions. *Open Forum Infect Dis* 2014;1(1):ofu024. doi: 10.1093/ofid/ofu024

5. Shigayeva A, *et al*. Invasive pneumococcal disease among immunocompromised persons: implications for vaccination programs. *Clin Infect Dis* 2016;62(2):139-147. doi: 10.1093/cid/civ803
6. Luijten RK, *et al*. Serious infections in systemic lupus erythematosus with a focus on pneumococcal infections. *Lupus* 2014;23(14):1512-1516. doi: 10.1177/0961203314543918
7. Furer V, *et al*. 2019 update of EULAR recommendations for vaccination in adult patients with autoimmune inflammatory rheumatic diseases. *Ann Rheum Dis* 2020;79(1):39-52. doi: 10.1136/annrheumdis-2019-215882
8. Kivitz AJ, *et al*. Vaccine responses in patients with rheumatoid arthritis treated with certolizumab pegol: results from a single-blind randomized phase IV trial. *J Rheumatol* 2014;41(4):648-657. doi: 10.3899/jrheum.130945
9. Rondaan C, *et al*. Efficacy, immunogenicity and safety of vaccination in adult patients with autoimmune inflammatory rheumatic diseases: a systematic literature review for the 2019 update of EULAR recommendations. *RMD Open* 2019;5(2):e001035. doi: 10.1136/rmdopen-2019-001035
10. Winthrop KL, *et al*. The effect of tofacitinib on pneumococcal and influenza vaccine responses in rheumatoid arthritis. *Ann Rheum Dis* 2016;75(4):687-695. doi: 10.1136/annrheumdis-2014-207191
11. Rasmussen SL, *et al*. Antibody response in patients with autoimmune inflammatory rheumatic disease after pneumococcal polysaccharide prime vaccination or revaccination. *Scand J Rheumatol* 2023;52(2):174-180. doi: 10.1080/03009742.2021.2008602
12. Nagra D, *et al*. No Waning of Pneumococcal Vaccine Responses over Time in People with Inflammatory Arthritis: Findings from a Single Centre Cohort. *Vaccines (Basel)* 2024;12(1). doi: 10.3390/vaccines12010069
13. Nagra D, *et al*. A Systematic Review and Meta-Analysis of Anti-Rheumatic Drugs and Pneumococcal Vaccine Immunogenicity in Inflammatory Arthritis. *Vaccines (Basel)* 2023;11(11). doi: 10.3390/vaccines11111680
14. Rakoczi E, *et al*. Evaluation of the immunogenicity of the 13-valent conjugated pneumococcal vaccine in rheumatoid arthritis patients treated with etanercept. *Joint Bone Spine* 2016;83(6):675-679. doi: 10.1016/j.jbspin.2015.10.017
15. Kapetanovic MC, *et al*. Methotrexate reduces vaccine-specific immunoglobulin levels but not numbers of circulating antibody-producing B cells in rheumatoid arthritis after vaccination with a conjugate pneumococcal vaccine. *Vaccine* 2017;35(6):903-908. doi: 10.1016/j.vaccine.2016.12.068

16. Kapetanovic MC, *et al.* Antibody response is reduced following vaccination with 7-valent conjugate pneumococcal vaccine in adult methotrexate-treated patients with established arthritis, but not those treated with tumor necrosis factor inhibitors. *Arthritis Rheum* 2011;63(12):3723-3732. doi: 10.1002/art.30580
17. Kapetanovic MC, *et al.* Rituximab and abatacept but not tocilizumab impair antibody response to pneumococcal conjugate vaccine in patients with rheumatoid arthritis. *Arthritis Res Ther* 2013;15(5):R171. doi: 10.1186/ar4358
18. Winthrop KL, *et al.* Evaluation of pneumococcal and tetanus vaccine responses in patients with rheumatoid arthritis receiving baricitinib: results from a long-term extension trial substudy. *Arthritis Res Ther* 2019;21(1):102. doi: 10.1186/s13075-019-1883-1
19. Winthrop KL, *et al.* T-cell-mediated immune response to pneumococcal conjugate vaccine (PCV-13) and tetanus toxoid vaccine in patients with moderate-to-severe psoriasis during tofacitinib treatment. *J Am Acad Dermatol* 2018;78(6):1149-1155 e1141. doi: 10.1016/j.jaad.2017.09.076
20. Mori S, *et al.* Impact of Janus kinase inhibitors on antibody response to 13-valent pneumococcal conjugate vaccine in patients with rheumatoid arthritis. *Mod Rheumatol* 2023;33(2):312-317. doi: 10.1093/mr/roac029
21. Winthrop K, *et al.* Evaluation of response to 13-valent conjugated pneumococcal vaccination in patients with rheumatoid arthritis receiving upadacitinib: results from a phase 2 open-label extension study. *RMD Open* 2022;8(1). doi: 10.1136/rmdopen-2021-002110
22. Platt HL, *et al.* A phase 3 trial of safety, tolerability, and immunogenicity of V114, 15-valent pneumococcal conjugate vaccine, compared with 13-valent pneumococcal conjugate vaccine in adults 50 years of age and older (PNEU-AGE). *Vaccine* 2022;40(1):162-172. doi: 10.1016/j.vaccine.2021.08.049
23. Nguyen MTT, *et al.* Initial serological response after prime-boost pneumococcal vaccination in rheumatoid arthritis patients: results of a randomized controlled trial. *J Rheumatol* 2017;44(12):1794-1803. doi: 10.3899/jrheum.161407
24. Nived P, *et al.* Prime-boost vaccination strategy enhances immunogenicity compared to single pneumococcal conjugate vaccination in patients receiving conventional DMARDs, to some extent in abatacept but not in rituximab-treated patients. *Arthritis Res Ther* 2020;22(1):36. doi: 10.1186/s13075-020-2124-3
25. Richi P, *et al.* Impact of biological therapies on the immune response after pneumococcal vaccination in patients with autoimmune inflammatory diseases. *Vaccines (Basel)* 2021;9(3). doi: 10.3390/vaccines9030203

26. Garcia Garrido HM, *et al*. Immunogenicity of the 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV13) Followed by the 23-Valent Pneumococcal Polysaccharide Vaccine (PPSV23) in Adults with and without Immunosuppressive Therapy. *Vaccines (Basel)* 2022;10(5). doi: 10.3390/vaccines10050795
27. Rezende RPV, *et al*. Combined 13-valent pneumococcal conjugate and 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine regimens for adults with systemic lupus erythematosus: Does the sequence of pneumococcal vaccination affect immunogenicity responses? A single-center cohort study in Brazil. *Lupus* 2023;32(5):694-703. doi: 10.1177/09612033231153535
28. Gerard AL, *et al*. Serum IgG2 levels predict long-term protection following pneumococcal vaccination in systemic lupus erythematosus (SLE). *Vaccine* 2020;38(44):6859-6863. doi: 10.1016/j.vaccine.2020.08.065
29. Bahuaud M, *et al*. Immunogenicity and persistence of a prime-boost re-vaccination strategy for pneumococcal vaccines in patients with rheumatoid arthritis. *Hum Vaccin Immunother* 2018;14(6):1464-1470. doi: 10.1080/21645515.2018.1438091
30. Kobayashi M, *et al*. Use of 15-valent pneumococcal conjugate vaccine and 20-valent pneumococcal conjugate vaccine among U.S. adults: updated recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices - United States, 2022. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2022;71(4):109-117. doi: 10.15585/mmwr.mm7104a1
31. Haranaka M, *et al*. A phase 3 randomized trial of the safety and immunogenicity of 20-valent pneumococcal conjugate vaccine in adults \geq 60 years of age in Japan, South Korea, and Taiwan. *Vaccine* 2024;42(5):1071-1077. doi: 10.1016/j.vaccine.2024.01.004
32. Essink B, *et al*. Pivotal Phase 3 Randomized Clinical Trial of the Safety, Tolerability, and Immunogenicity of 20-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine in Adults Aged \geq 18 Years. *Clin Infect Dis* 2022;75(3):390-398. doi: 10.1093/cid/ciab990
33. Kobayashi M, *et al*. Expanded recommendations for use of pneumococcal conjugate vaccines among adults aged \geq 50 years: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices - United States, 2024. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2025;74(1):1-8. doi: 10.15585/mmwr.mm7401a1
34. Azuma M, *et al*. Safety and immunogenicity of sequential administration of PCV13 followed by PPSV23 in pneumococcal vaccine-naïve adults aged \geq 65 years: Comparison of booster effects based on intervals of 0.5 and 1.0 year. *Vaccine* 2023;41(5):1042-1049. doi: 10.1016/j.vaccine.2022.12.060
35. Coulson E, *et al*. Pneumococcal antibody levels after pneumovax in patients with rheumatoid arthritis on methotrexate. *Ann Rheum Dis* 2011;70(7):1289-1291. doi: 10.1136/ard.2010.144451

36. Nagel J, *et al*. The risk of pneumococcal infections after immunization with pneumococcal conjugate vaccine compared to non-vaccinated inflammatory arthritis patients. *Scand J Rheumatol* 2015;44(4):271-279. doi: 10.3109/03009742.2014.984754
37. Nagel J, *et al*. Reduced risk of serious pneumococcal infections up to 10 years after a dose of pneumococcal conjugate vaccine in established arthritis. *Vaccine* 2023;41(2):504-510. doi: 10.1016/j.vaccine.2022.11.075
38. Alvarez CA, *et al*. Impact of PCV13 and PPSV23 Vaccination on Invasive Pneumococcal Disease in Adults with Treated Rheumatoid Arthritis: A Population-Based Study. *Microorganisms* 2024;12(10). doi: 10.3390/microorganisms12102073
39. Alvarez CA, *et al*. Compliance with recommended pneumococcal vaccination schedule in patients treated for rheumatoid arthritis: A retrospective cohort study in the Veterans Affairs population. *Vaccine* 2024;42(3):489-495. doi: 10.1016/j.vaccine.2023.12.075

9. 悪性腫瘍・臓器移植後

【病態の特徴】

抗がん治療の進歩に伴い、従来の殺細胞性化学療法に伴う免疫不全に加え、ワクチン効果に大きな影響を与える分子標的薬も日常的に使用されている。消化器がんを中心とした腹腔内のがんでは手術の際に脾摘を行うこともある。骨髄増殖性疾患やリンパ系悪性腫瘍では疾患そのものによる液性免疫不全に加え、脾摘や脾照射を行う場合もあり高度の液性免疫不全をきたしうる。造血幹細胞移植後は液性免疫の回復に最低でも1~2年程度を要するとされるが、自家造血幹細胞移植後中央値7年の患者56例全例で肺炎球菌に対する抗体価が不十分であったとの報告もある¹⁾。 固形臓器移植では移植後の免疫抑制薬の長期使用が肺炎球菌感染症の主なリスクとなる。

【肺炎球菌感染症の発生頻度と予後】

小児へのPCV接種導入により成人の悪性腫瘍患者でも侵襲性肺炎球菌感染症(IPD)が減少したが²⁾、悪性腫瘍患者や移植患者はIPDの罹患リスクや致死率が高いことが知られている³⁾。デンマークの大規模データベース研究報告では非悪性腫瘍患者と比較したIPDのリスク比は固形腫瘍患者で1.78(95%信頼区間(CI) 1.70-1.87)、血液腫瘍患者で9.53(95%CI 8.85-10.27)と高く、なかでも多発性骨髄腫や急性リンパ芽球性白血病などのリンパ系腫瘍ではリスク比は35を超えると報告された⁴⁾。また、肺炎球菌肺炎は血液腫瘍患者における市中肺炎の9%を占め、重症化リスク因子である(オッズ比(OR) 10.24 [95%CI

3.48-30.1]) ことがオランダから報告されている⁵⁾。その一方で、IPD の致命率は血液腫瘍より 固形腫瘍の方が高いとする報告も複数ある^{3, 4)}。IPD の罹患リスクは悪性腫瘍診断後や移植後 2 年以内が最も高いが、多発性骨髄腫や非ホジキンリンパ腫、慢性リンパ性白血病のように診断後 10 年を経過しても一般人口に比べたリスク比が 10 前後と高い疾患もある⁴⁾。

国内のデータベース研究では、64 歳以下でも 19~49 歳の若年悪性腫瘍患者における肺炎球菌肺炎の罹患リスクが健常人と比較して特に高いこと（ハザード比（HR） 8.32 [2.23-31.1] など）が示されている^{6, 7)}。また、55~64 歳の IPD 罹患患者の 26.6%が悪性腫瘍を基礎疾患としており、抗がん剤治療による免疫不全が IPD における死亡のリスク因子（HR 2.4 [95%CI 1.0-5.2]）との報告もある⁸⁾。造血幹細胞移植患者では移植後数年経過していても発症後 1 週間以内に死亡するような IPD を合併し得る⁹⁾。このように、悪性腫瘍患者、移植後患者では 65 歳未満であっても予防対策が重要となる。

【肺炎球菌ワクチンの免疫原性】

悪性腫瘍患者や移植後患者におけるワクチン効果に関する研究の多くはワクチン接種後の血清免疫応答で評価されている。血液腫瘍でも多発性骨髄腫や悪性リンパ腫などである一定の有効抗体獲得効果が報告されているが、慢性リンパ性白血病では PPSV23 の有効抗体獲得率は著しく低い¹⁰⁻¹²⁾。慢性リンパ性白血病や造血幹細胞移植後、固形臓器移植後患者では、PCV の方が PPSV23 より免疫原性において優れることが示されている¹³⁻¹⁵⁾。固形臓器移植患者を対象とした血清免疫応答の研究のシステムティックレビューでは PPSV23 と PCV7 を合わせて 83% (95%CI 83-93%、 $I^2=81\%$) の効果が示されたが、高い不均一性を示しており効果が過大評価されている可能性がある¹⁶⁾。

【肺炎球菌ワクチンの予防効果】

診断後 5 年以上生存した 75 歳以上の悪性腫瘍患者を対象とした研究では、PPSV23 接種は肺炎による入院事例の有意な減少と関連していた（調整罹患率比（IRR） 0.695 [95%CI 0.501-0.965]）が、全生存時間は同程度であった¹⁷⁾。75 歳以上の前立腺癌や大腸癌、肺癌患者を対象とした検討では、PPSV23 接種は肺炎関連入院に加え全生存率の有意な減少と関連していた^{18, 19)}。ただし、これらの PPSV23 研究は RCT ではなく、いずれも台湾におけるデータベース研究である点に注意が必要である。

血液腫瘍患者において治療開始前の PCV13 接種が肺炎や敗血症による入院の有意な減少と関連していたというイスラエルの報告がある（OR 0.45 [95%CI 0.246-0.839]）²⁰⁾。また、造血幹細胞移植後患者において、PPSV23 のみから PCV と PPSV23 の連続接種に推奨を変更したところ IPD が約 10 分の 1 に減少したというオーストラリアの報告がある²¹⁾。

【接種スケジュール】

PCV15/20 が 2021 年に承認された米国では、PCV15/20 は PCV13 と比較した免疫原性や安全性の非劣性かつカバーする血清型の範囲を広げる可能性が示されたとして、65 歳以上のすべての成人および 19~64 歳の特定の基礎疾患もしくはリスク因子をもつ成人において PCV20 単回接種もしくは PCV15-PPSV23 の連続接種が推奨されている²²⁾。国内では 2022 年に PCV15 が、2024 年に PCV20 が国内で承認され、本合同委員会で公表した「65 歳以上の成人に対する肺炎球菌ワクチン接種に関する考え方 第 6 版」で、PCV13、PCV15、PCV20 は安全性、免疫原性に大きな違いはないものの、血清型カバー率において、PCV20 は PCV13 及び PCV15 より優れていると考えられ、米国と同様の接種が推奨されている。PCV15/20 において、悪性腫瘍患者や固形臓器移植を対象とした比較研究はないが、同種造血幹細胞移植患者を対象とした PCV13 と PCV15 を比較したランダム化比較試験では、共通の血清型では同等の免疫原性、22F と 23F では PCV15 接種群の免疫原性が高いことが示された²³⁾。以上を踏まえて悪性腫瘍・臓器移植後患者のワクチンスケジュールについて記載する。

1) 悪性腫瘍・固形臓器移植

米国 CDC では、悪性腫瘍や固形臓器移植患者を含む免疫不全の患者（19~64 歳）への肺炎球菌ワクチンの推奨として以下の表 4 のとおり推奨している²²⁾。The National Comprehensive Cancer Network (NCCN)²⁴⁾ や米国臨床腫瘍学会 (ASCO) のガイドライン²⁵⁾でも同様の推奨としている。

リツキシマブなどの抗 B 細胞抗体治療を行なった場合には、投与から 6 か月以内ではインフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチンなどの不活化ワクチンの効果が著しく低いことが知られており、抗 B 細胞抗体治療後 6~12 か月以内の投与は推奨されない。

表 4 特定の免疫抑制状態にある 19-64 歳の成人に対する米国 Advisory Committee on Immunization Practices の推奨 (2023 年)²²⁾

以前のワクチン接種	Option A (PCV20 が使用できる場合)	Option B (PCV15 と PPSV23 が使用できる場合)
なし、不明もしくは PCV7 のみ	PCV20 単回接種	PCV15 単回接種後 8 週間以上の間隔で PPSV23 単回接種
PPSV23 のみ	最後の PPSV23 接種後 1 年以上の間隔で PCV20 単回接種	最後の PPSV23 接種後 1 年以上の間隔で PCV15 単回接種
PCV13 のみ	最後の PCV13 接種後 1 年以上の間隔で PCV20 単回接種	最後の PCV13 接種後 8 週間以上の間隔で PPSV23 単回接種 最後の PPSV23 接種後 5 年以上の間隔で 2 回目の PPSV23 接種 65 歳以上となった時点で肺炎球菌ワクチンの推奨を見直す
PCV13 と PPSV23 単回	最後の PCV13 もしくは PPSV23 接種後 5 年以上の間隔で PCV20 単回接種	最後の PCV13 接種後 8 週間以上の間隔で PPSV23 単回接種 最後の PPSV23 接種後 5 年以上の間隔で PPSV23 接種 65 歳以上となった時点で肺炎球菌ワクチンの推奨を見直す
PCV13 と PPSV23 2 回	最後の PCV13 もしくは PPSV23 接種後 5 年以上の間隔で PCV20 単回接種	65 歳以上となった時点で肺炎球菌ワクチンの推奨を見直す

2) 造血幹細胞移植

造血幹細胞移植後の成人ではワクチン非接種者として小児期のワクチンを接種し直すことが推奨されており、小児と同様に PCV の 3 回接種が推奨され、その後にカバーする血清型の範囲を広げる目的で PPSV23 の接種が推奨されてきた²⁶⁾。国内で PCV13 の 3 回接種と 4 回接種のランダム化比較試験 (RCT) も行われたが同等の免疫原性であった²⁷⁾。PCV13 接種開始時期を移植 3 か月後と 9 か月後で比較した RCT では同等の免疫原性であり¹⁵⁾、移植後 3~6 か月後にワクチン接種を開始することが可能と考えられている。しかし慢性 GVHD やステロイド薬投与が PPSV23 接種の効果を減弱させることが知られており、移植 1 年以降の PPSV23 接種時にステロイド薬を要する慢性 GVHD がある場合には PPSV23 ではなく PCV を接種することが推奨される。

米国 CDC では PCV20 の承認に伴い Option A として移植 3 か月以降に PCV20 を 4 週間毎に 3 回接種し、3 回目接種 6 か月以降 (もしくは移植 12 カ月以降) での 4 回目 PCV20 接種、Option B として PCV20 が使用できない場合は移植 3 か月以降に PCV15 を 4 週間毎に 3 回接種し、3 回目接種 6 か月以降 (もしくは移植 12 カ月以降) での PPSV23 接種 (慢性 GVHD がある場合は PCV15 接種) が推奨されている²²⁾。NCCN (PCV の間隔は

1~2か月としている)²⁴⁾や ASCO ガイドライン²⁵⁾も同様の推奨としている。

3) CAR-T 治療 (chimeric antigen receptor) -T 細胞治療

CD19 標的 CAR の場合はさらに長期間ワクチンの効果が得られない可能性がある²⁸⁾。エビデンスに乏しく、エキスパートオピニオンに基づくガイドラインとして、2024 年の米国移植細胞治療学会のガイドラインでは、治療 6 カ月以降に PCV20 の 3 回接種 (1~2 か月間隔) を推奨している。しかし、接種 1~2 か月後の抗体価測定で 15/20 以上の血清型で有効抗体価を獲得できていれば、それ以降の接種は不要としている²⁹⁾ (国内では研究目的以外での抗体価測定は困難)。

悪性腫瘍患者など免疫不全者における肺炎球菌ワクチン接種率は低い⁴⁾。国内でのアンケート研究でも慢性肺疾患や糖尿病、慢性心疾患などと比較すると悪性腫瘍患者の PPSV23 接種率は低い傾向が示されているが、医師からの推奨が接種に有意に関連する因子 (調整 OR 50~59 歳: 126.68、60~64 歳: 23.48、65 歳以上: 4.09) として抽出されている³⁰⁾。海外でも同様の報告があり、医師からの適切な情報提供や接種推奨が重要と考えられる。

【肺炎球菌ワクチンの接種推奨の要点】

- 1) 悪性腫瘍患者、固形臓器移植後患者には PCV20 の単回接種もしくは PCV15-PPSV23 の連続接種が推奨される。後者の場合、接種間隔は少なくとも 8 週間あける (過去に肺炎球菌ワクチン接種歴がある場合は表 4 を参照)^{22, 25)}。
- 2) 造血幹細胞移植後 3~6 か月で PCV20 接種を開始し、1~2 か月間隔で 3 回接種することが推奨される。加えて 最後の PCV20 接種から 6 か月もしくは移植後 1 年以降に 4 回目の PCV20 の接種が推奨される。もしくは造血幹細胞移植後 3~6 か月で PCV15 接種を開始し、1~2 か月間隔で 3 回接種することが推奨される。加えて 最後の PCV15 接種から 6 か月もしくは移植後 1 年以降に PPSV23 の接種が推奨されるが、この時に 慢性 GVHD を合併している場合には PPSV23 の代わりに PCV15 を用いる^{22, 25)}。
- 3) CAR-T 治療後 6 か月以降に 1~2 か月間隔で PCV20 の 3 回接種を行うことが米国移植細胞治療学会で推奨されているが、今後の各種ガイドライン等も参考に接種スケジュールを検討する²⁹⁾。
- 4) 抗 B 細胞抗体治療後 6~12 か月以内のワクチン接種は推奨しない^{31, 32)}。

引用文献

1. Colton H, et al. Long-term survivors following autologous haematopoietic stem cell transplantation have significant defects in their humoral immunity against vaccine preventable diseases, years on from transplant. Vaccine 2021;39(34):4778-4783. doi: 10.1016/j.vaccine.2021.07.022

2. Lee YJ, *et al.* Trends in invasive pneumococcal disease in cancer patients after the introduction of 7-valent pneumococcal conjugate vaccine: a 20-year longitudinal study at a major urban cancer center. *Clin Infect Dis* 2018;66(2):244-253. doi: 10.1093/cid/cix739
3. Shigayeva A, *et al.* Invasive Pneumococcal Disease Among Immunocompromised Persons: Implications for Vaccination Programs. *Clin Infect Dis* 2016;62(2):139-147. doi: 10.1093/cid/civ803
4. Andersen MA, *et al.* Differences and Temporal Changes in Risk of Invasive Pneumococcal Disease in Adults with Hematological Malignancies: Results from a Nationwide 16-Year Cohort Study. *Clin Infect Dis* 2021;72(3):463-471. doi: 10.1093/cid/ciaa090
5. Certan M, *et al.* Incidence and predictors of community-acquired pneumonia in patients with hematological cancers between 2016 and 2019. *Clin Infect Dis* 2022;75(6):1046-1053. doi: 10.1093/cid/ciac005
6. Imai K, *et al.* Risk of pneumococcal diseases in adults with underlying medical conditions: a retrospective, cohort study using two Japanese healthcare databases. *BMJ Open* 2018;8(3):e018553. doi: 10.1136/bmjopen-2017-018553
7. Fukuda H, *et al.* Risk factors for pneumococcal disease in persons with chronic medical conditions: Results from the LIFE Study. *Int J Infect Dis* 2022;116:216-222. doi: 10.1016/j.ijid.2021.12.365
8. Hanada S, *et al.* Multiple comorbidities increase the risk of death from invasive pneumococcal disease under the age of 65 years. *J Infect Chemother* 2021;27(9):1311-1318. doi: 10.1016/j.jiac.2021.04.018
9. Okinaka K, *et al.* Clinical characteristics and risk factors of pneumococcal diseases in recipients of allogeneic hematopoietic stem cell transplants in the late phase: A retrospective registry study. *J Infect Chemother* 2023;29(7):726-730. doi: 10.1016/j.jiac.2023.04.015
10. Lindström V, *et al.* Antibody response to the 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine after conjugate vaccine in patients with chronic lymphocytic leukemia. *Hum Vaccin Immunother* 2019;15(12):2910-2913. doi: 10.1080/21645515.2019.1627160
11. Sinisalo M, *et al.* Response to vaccination against different types of antigens in patients with chronic lymphocytic leukaemia. *Br J Haematol* 2001;114(1):107-110. doi: 10.1046/j.1365-2141.2001.02882.x
12. Hartkamp A, *et al.* Antibody responses to pneumococcal and haemophilus vaccinations in patients with B-cell chronic lymphocytic leukaemia. *Vaccine* 2001;19(13-14):1671-1677. doi: 10.1016/s0264-410x(00)00409-6

13. Svensson T, *et al*. Pneumococcal conjugate vaccine triggers a better immune response than pneumococcal polysaccharide vaccine in patients with chronic lymphocytic leukemia A randomized study by the Swedish CLL group. *Vaccine* 2018;36(25):3701-3707. doi: 10.1016/j.vaccine.2018.05.012
14. Takeshita K, *et al*. Immunogenicity and safety of routine 13-valent pneumococcal conjugate vaccination outside recommended age range in patients with hematological malignancies and solid tumors. *Vaccine* 2022;40(9):1238-1245. doi: 10.1016/j.vaccine.2022.01.056
15. Cordonnier C, *et al*. Randomized study of early versus late immunization with pneumococcal conjugate vaccine after allogeneic stem cell transplantation. *Clin Infect Dis* 2009;48(10):1392-1401. doi: 10.1086/598324
16. Eckerle I, *et al*. Serologic vaccination response after solid organ transplantation: a systematic review. *PLoS One* 2013;8(2):e56974. doi: 10.1371/journal.pone.0056974
17. Chiou WY, *et al*. Effectiveness of 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine on elderly long-term cancer survivors: a population-based propensity score matched cohort study. *BMJ Open* 2018;8(5):e019364. doi: 10.1136/bmjopen-2017-019364
18. Li CY, *et al*. Impact of 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccination on the frequency of pneumonia-related hospitalization and survival in elderly patients with prostate cancer: A seven-year nationwide matched cohort study. *Cancer* 2021;127(1):124-136. doi: 10.1002/cncr.33203
19. Chiou WY, *et al*. Effectiveness of 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine on elderly patients with colorectal cancer: A population-based propensity score-matched cohort study. *Medicine (Baltimore)* 2019;98(50):e18380. doi: 10.1097/md.00000000000018380
20. Draliuk R, *et al*. Association between PCV13 pneumococcal vaccination and risk of hospital admissions due to pneumonia or sepsis among patients with haematological malignancies: a single-centre retrospective cohort study in Israel. *BMJ Open* 2022;12(4):e056986. doi: 10.1136/bmjopen-2021-056986
21. Roberts MB, *et al*. Clinical Effectiveness of Conjugate Pneumococcal Vaccination in Hematopoietic Stem Cell Transplantation Recipients. *Biol Blood Marrow Transplant* 2019. doi: 10.1016/j.bbmt.2019.10.006
22. Kobayashi M, *et al*. Pneumococcal vaccine for adults aged ≥ 19 years: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices, United States, 2023. *MMWR Recomm Rep* 2023;72(3):1-39. doi: 10.15585/mmwr.rr7203a1
23. Wilck M, *et al*. A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Comparator-Controlled Study to Evaluate Safety, Tolerability, and Immunogenicity of V114, a 15-Valent Pneumococcal

- Conjugate Vaccine, in Allogeneic Hematopoietic Cell Transplant Recipients (PNEU-STEM). *Clin Infect Dis* 2023;77(8):1102-1110. doi: 10.1093/cid/ciad349
- 24. (NCCN) TNCCN. NCCN Guidelines: Prevention and Treatment of Cancer-Related Infections. <https://www.nccn.org/guidelines/guidelines-detail?category=3&id=1457>. Accessed Jan 31, 2025.
 - 25. Kamboj M, *et al.* Vaccination of adults with cancer: ASCO guideline. *J Clin Oncol* 2024;42(14):1699-1721. doi: 10.1200/jco.24.00032
 - 26. Rubin LG, *et al.* 2013 IDSA clinical practice guideline for vaccination of the immunocompromised host. *Clin Infect Dis* 2014;58(3):309-318. doi: 10.1093/cid/cit816
 - 27. Okinaka K, *et al.* Immunogenicity of three versus four doses of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine followed by 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine in allogeneic haematopoietic stem cell transplantation recipients: a multicentre, randomized controlled trial. *Clin Microbiol Infect* 2023;29(4):482-489. doi: 10.1016/j.cmi.2022.12.007
 - 28. Lee D, *et al.* Pneumococcal conjugate vaccine does not induce humoral response when administrated within the six months after CD19 CAR T-cell therapy. *Transplant Cell Ther* 2023;29(4):277.e271-277.e279. doi: 10.1016/j.jtct.2022.08.011
 - 29. Shahid Z, *et al.* Best practice considerations by The American Society of Transplant and Cellular Therapy: Infection prevention and management after chimeric antigen receptor t cell therapy for hematological malignancies. *Transplant Cell Ther* 2024;30(10):955-969. doi: 10.1016/j.jtct.2024.07.018
 - 30. Kawakami K, *et al.* A Japanese nationwide survey of 23-valent pneumococcal capsular polysaccharide vaccine (PPSV23) coverage among patients with chronic medical condition aged 50 and older. *Hum Vaccin Immunother* 2020;16(7):1521-1528. doi: 10.1080/21645515.2019.1690332
 - 31. Mikulska M, *et al.* Vaccination of patients with haematological malignancies who did not have transplantations: guidelines from the 2017 European Conference on Infections in Leukaemia (ECIL 7). *Lancet Infect Dis* 2019;19(6):e188-e199. doi: 10.1016/S1473-3099(18)30601-7
 - 32. Rubin LG, *et al.* 2013 IDSA clinical practice guideline for vaccination of the immunocompromised host. *Clin Infect Dis* 2014;58(3):e44-100. doi: 10.1093/cid/cit684

10. 免疫不全（主に小児）

【肺炎球菌感染症が重症化しやすい基礎疾患】

肺炎球菌感染症が重症化しやすい基礎疾患としては、まず機能的／解剖学的無脾症があげられる。無脾症患者は細菌の濾過機能と好中球の貪食機能が低下するため、先天的な無脾症や鎌状赤血球症のほか、脾臓摘出術を受けた者も含めて肺炎球菌感染症が重症化しやすい。慢性髄液漏を伴う者や人工内耳装用者も肺炎球菌性髄膜炎のリスク因子となる。また、補体欠損症など原発性免疫不全症も重症化しやすい基礎疾患としてあげられる。原発性免疫不全症の中には、肺炎球菌感染症に対して特異的に易感染性が認められる自然免疫系の異常であるIRAK-4欠損症なども見つかっている。このほか、HIV感染、悪性疾患、循環器・呼吸器の慢性疾患、腎不全、肝機能障害、糖尿病や、免疫抑制化学療法を受けている者、臓器移植、骨髄移植を受けたことのある者も肺炎球菌感染症のハイリスク者である。

米国の2007～2009年PCV13導入前の小児侵襲性肺炎球菌感染症（IPD）サーベイランスデータによると、6～18歳の小児例において、IPDの49%がPCV13含有血清型、23%がPPSV23含有血清型（PCV13含有血清型を除く）であり、血液悪性疾患、HIV/AIDS、鎌状赤血球症の健常児に対するリスク比は、それぞれ822、122、27とされる¹⁾。また、マサチューセッツ州からの2002年～2014年の小児IPDのサーベイランス報告によると18歳未満の症例の中で、22.1%が基礎疾患有しており、最も多かったのが免疫不全状態（32.7%）、慢性呼吸器疾患（22.4%）であった²⁾。

英国からの2006～2014年の報告では、PCV7/PCV13血清型の小児IPDの22%に基礎疾患があり、悪性疾患、免疫不全状態が主体であったとされる³⁾。また、カナダからの2009～2018年（10年間）のハイリスク小児IPD 94症例に関する後方視的検討によると、IPD罹患者の基礎疾患は、悪性疾患、臓器・骨髄移植患者、鎌状赤血球症の順であり、34%の症例が免疫抑制薬を使用していた⁴⁾。

一方、国内では2014～2021年における全国10道県の小児侵襲性肺炎球菌感染症サーベイランス調査（AMED「菅班」）において、6歳以上15歳以下の症例は89人あり、そのうち、38人（42.7%）が肺炎球菌感染症のリスク因子となる基礎疾患有していた⁵⁾（表2）。また、これまでの国内での小児の肺炎球菌感染症報告例をまとめたレビュー論文によると、小児IPDでは、慢性心疾患、慢性肺疾患、慢性腎疾患、髄液漏、無脾症、ダウント症候群、早産低出生体重児、悪性疾患がリスク因子となっていた⁶⁾。

【肺炎球菌ワクチンの免疫原性】

PPSV23はB細胞の発達が未熟な2歳未満の乳幼児では十分な免疫が誘導できず予防効果は得られない。一方、PCV15/PCV20は、T細胞依存性抗原であるジフテリア変異蛋白を結合させたことによって、乳児（日本では生後2か月から接種）にもB細胞とT細胞の相互作用により優れた免疫応答を誘導できるとともに、メモリーB細胞を誘導出来たため、複数回接種によるブースター効果も期待できるワクチンである。

実際、国内で小児を含む血液腫瘍疾患・骨髄移植後患者に対するPCV13接種前後での免疫原性について検討した報告によると、PCV13接種後、血清型 1、3、5、6A、7F、19Aに対するOPAの上昇と血清型3に対するメモリーB細胞数の上昇が確認されている⁷⁾。無脾症・脾臓摘出患者に対する肺炎球菌ワクチンの免疫原性に関しては、無脾症・脾臓摘出患者のPCV7接種による抗体価上昇は良好であり、PPSV23単回接種は抗体保持が不十分で、PCV7+PPSV23の方がより抗体獲得率が高いとされる⁸⁻¹⁰⁾。慢性髄液漏を伴う者や人工内耳装用者は、基礎疾患として免疫不全症がない場合には、肺炎球菌ワクチンに対する免疫原性は健常者と変わらない。原発性免疫不全症患者においては、肺炎球菌ワクチンの免疫原性は低下することが予想されるが、不活化ワクチンは合併症への危険性はないので、有効性があると考えられる疾患（補体欠損症、IgGサブクラス欠損症、IRAK-4欠損症など）に対しては、積極的に接種を行うことが推奨される¹¹⁾。なお、いずれの疾患においても長期的な免疫原性については明らかになっていない。

PCV15については、小児の鎌状赤血球症（5歳～17歳、PCV13/PCV15 単回接種）、HIV感染症患者（6～17歳、PCV13/PCV15単回接種8週間後、PPSV23接種）、同種造血幹細胞移植を受けた患者（小児患者は3歳以上18歳未満、PCV13/PCV15 3回接種、移植1年後にPPSV23あるいはPCV13/PCV15 1回接種）を対象としたPCV15とPCV13の免疫原性と安全性について比較検討した第Ⅲ相多施設プラセボ対照二重盲検比較試験において、両群とも安全性に問題はなく、免疫原性に関しては、PCV15はPCV13に対して、共通する13血清型については非劣性を示した¹²⁻¹⁴⁾。一方、PCV15はPCV13に対し、22F、33Fの2血清型に関して優位性を示したと報告されている¹²⁻¹⁴⁾。また、海外の第Ⅲ相試験において、7か月～17歳の未接種あるいは価数の少ないPCV既接種者に対しPCV15によるキャッチアップ接種を行った結果、PCV13と比較し良好な免疫原性が認められたと報告されている¹⁵⁾。

PCV20については、18歳未満のハイリスク小児を対象とした臨床試験は実施されていないものの、2～6か月齢の健康小児を対象とした国内第Ⅲ相試験、生後15か月以上18歳未満の健康小児を対象とした海外第Ⅲ相試験および6～64歳のハイリスク者を対象としたPCV13の国内第Ⅲ相試験の成績から、18歳未満のハイリスク小児についても、13共通血清型による肺炎球菌感染症に対してPCV13と同程度の予防効果が期待され、7追加血清型による肺炎球菌感染症に対する予防にも寄与できると評価されている¹⁶⁾。

【ワクチン予防効果】


ハイリスク小児に対するワクチンの予防効果に関して、米国の8つの小児病院からの報告によると、PCV13導入後、2014～2017年の小児IPD患者495人のうち、227人に基礎疾患が認められ、PCV13含有血清型による感染症は全体の23.5%を占めていた。基礎疾患有する小児では、有意に非PCV13血清型による感染症が多かったとされる¹⁷⁾。また、同じ8つの小児病院の移植患者のIPD罹患状況に関する調査（2000～2014年）結果報告による

と、IPD患者に占める移植患者の割合は増加しており、ワクチン接種歴の明らかなIPD患者61人中、1回以上PCV接種を受けていた者は30人、そのうち3回以上受けていた人は20人とワクチン接種が不十分であったとされる¹⁸⁾。

【接種スケジュール】

米国CDCは、機能的または解剖学的無脾症、髄液漏、人工内耳、原発性免疫不全症、HIV感染症、慢性肺疾患、慢性心疾患、慢性腎疾患、慢性肝疾患、糖尿病、ネフローゼ症候群、骨髄移植後、臓器移植後、その他の免疫不全状態の、6歳以上のPCV13/PCV15/PCV20未接種者に対して、①PCV20を1回接種すること、あるいは、②PCV15を接種しその後8週間以上の間隔を空けて、PPSV23接種することを推奨している。また、6歳以前にPCV13/PCV15接種歴があるが、PPSV23未接種の場合は、最後のPCV接種から8週間以上空けて、PCV20あるいはPPSV23を1回接種する。PPSV23を選択した場合には、5年以上空けて、PCV20あるいはPPSV23の接種を1回行う、PPSV23既接種の場合は、5年以上空けて、PCV20あるいはPPSV23の接種を1回行うことを推奨している（図1）¹⁹⁾。

図1 肺炎球菌感染症ハイリスク小児に対するワクチン接種



造血幹細胞移植を受けた小児患者に対しては、PCV20を移植3～6か月後から4週間隔で3回接種し、3回目のPCV20接種から6か月以上経過してから、または移植から12か月以上経過してから、いずれか遅い方で4回目のPCV20接種を行う。PCV20が使用できない場合は、PCV15を同様のスケジュールで3回接種し、4回目の接種はPCV15あるいはPPSV23で行うことを推奨している¹⁹⁾。

国内でも日本小児科学会はこれまでPCV13未接種の定期接種年齢対象外の肺炎球菌感染

症ハイリスク小児患者に対して同様の接種を推奨してきた。しかしながら、日本小児感染症学会で会員を対象にアンケートを実施したところ、定期接種年齢対象外のハイリスク者に対してPCV13接種を勧めている施設は、無脾症・摘脾・脾機能不全者で69%、血液腫瘍疾患、原発性免疫不全症、臓器移植後患者ではそれぞれ53%、50%、42%と限定的であった²⁰⁾。そのため、基礎疾患のある小児に対する肺炎球菌ワクチンの予防効果については十分検証できていない。なお、前述した国内10道県における小児IPDサーベイランスでは、2023年の1年間に認められた症例の中で、PCV15含有血清型、PCV20含有血清型はそれぞれIPD症例の10.0%、35.0%を占めていた⁵⁾。現在、PCV15/PCV20共に、全ての年齢の肺炎球菌感染症ハイリスク者に対して任意接種ワクチンとして接種が可能である。今後、国内において新しく導入されたPCV15/PCV20のハイリスク小児に対する予防効果について検証していくことが必要である。

【肺炎球菌ワクチン推奨の要点】

- 1) 無脾症、慢性髄液漏を伴う者、人工内耳装用者、補体欠損症などの原発性免疫不全、慢性疾患を基礎疾患として有する場合、免疫不全状態の者は、肺炎球菌感染症が重症化しやすい。PCV15/PCV20の定期接種対象年齢は5歳未満（長期療養特例対象は6歳未満）であるが、これらの基礎疾患を有する小児や免疫不全状態の小児に対して、PCV13/PCV15/PCV20未接種の場合、6歳以上であってもPCV20の接種あるいはPCV15の接種と接種後8週間以上の間隔をあけてPPSV23の接種を行うことが望ましい。
- 2) PCV13/PCV15接種歴があるが、PPSV23未接種の場合は、最後のPCV接種から8週間以上あけて、PCV20あるいはPPSV23を1回接種する。PPSV23を選択した場合には、5年以上あけて、PCV20あるいはPPSV23の接種を1回行う。PPSV23既接種の場合は、5年以上空けて、PCV20あるいはPPSV23の接種を1回行う。
- 3) 慢性肺疾患、慢性心疾患、慢性腎疾患、慢性肝疾患、糖尿病、自己免疫性疾患、悪性疾患・臓器移植の小児に対する方針は、各項目の方針を参考とする。

引用文献

1. CDC. Use of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine and 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine among children aged 6-18 years with immunocompromising conditions: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2013;62(25):521-524. doi: 10.15585/mmwr.2013-0524.
2. Yildirim I, et al. Vaccination, underlying comorbidities, and risk of invasive pneumococcal disease. Pediatrics 2015;135(3):495-503. doi: 10.1542/peds.2014-2426
3. Olibu G, et al. Characteristics and Serotype Distribution of Childhood Cases of Invasive Pneumococcal Disease Following Pneumococcal Conjugate Vaccination in

- England and Wales, 2006-2014. Clin Infect Dis 2017;65(7):1191-1198. doi: 10.1093/cid/cix418
4. van Warmerdam J, *et al*. Invasive Pneumococcal Disease in High-risk Children: A 10-Year Retrospective Study. Pediatr Infect Dis J 2023;42(1):74-81. doi: 10.1097/inf.0000000000003748
 5. 小児・成人の侵襲性肺炎球菌感染症の疫学情報. <https://ipd-information.com>. Accessed Jan 29, 2025.
 6. Ishiwada N. Current situation and need for prevention of invasive pneumococcal disease and pneumococcal pneumonia in 6- to 64-year-olds in Japan. J Infect Chemother 2021;27(1):7-18. doi: 10.1016/j.jiac.2020.09.016
 7. Takeshita K, *et al*. Immunogenicity and safety of routine 13-valent pneumococcal conjugate vaccination outside recommended age range in patients with hematological malignancies and solid tumors. Vaccine 2022;40(9):1238-1245. doi: 10.1016/j.vaccine.2022.01.056
 8. Mikoluc B, *et al*. Immune response to the 7-valent pneumococcal conjugate vaccine in 30 asplenic children. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2008;27(10):923-928. doi: 10.1007/s10096-008-0523-5
 9. Smets F, *et al*. Randomised revaccination with pneumococcal polysaccharide or conjugate vaccine in asplenic children previously vaccinated with polysaccharide vaccine. Vaccine 2007;25(29):5278-5282. doi: 10.1016/j.vaccine.2007.05.014
 10. Meerveld-Eggink A, *et al*. Response to conjugate pneumococcal and Haemophilus influenzae type b vaccines in asplenic patients. Vaccine 2011;29(4):675-680. doi: 10.1016/j.vaccine.2010.11.034
 11. Bonilla FA, *et al*. Practice parameter for the diagnosis and management of primary immunodeficiency. J Allergy Clin Immunol 2015;136(5):1186-1205 e1181-1178. doi: 10.1016/j.jaci.2015.04.049
 12. Quinn CT, *et al*. Safety and immunogenicity of V114, a 15-valent pneumococcal conjugate vaccine, in children with SCD: a V114-023 (PNEU-SICKLE) study. Blood Adv 2023;7(3):414-421. doi: 10.1182/bloodadvances.2022008037
 13. Wilck M, *et al*. A phase 3 study of safety and immunogenicity of V114, a 15-valent PCV, followed by PPSV23, in children living with HIV. Aids 2023;37(8):1227-1237. doi: 10.1097/qad.0000000000003551
 14. Wilck M, *et al*. A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Comparator-Controlled Study to Evaluate Safety, Tolerability, and Immunogenicity of V114, a 15-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine, in Allogeneic Hematopoietic Cell Transplant Recipients (PNEU-STEM). Clin Infect Dis 2023;77(8):1102-1110. doi: 10.1093/cid/ciad349

15. Bannettis N, *et al*. A phase III, multicenter, randomized, double-blind, active comparator-controlled study to evaluate the safety, tolerability, and immunogenicity of catch-up vaccination regimens of V114, a 15-valent pneumococcal conjugate vaccine, in healthy infants, children, and adolescents (PNEU-PLAN). *Vaccine* 2022;40(44):6315-6325. doi: 10.1016/j.vaccine.2022.09.003
16. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構. プレベナー20 水性懸濁注 審査報告書.
https://www.pmda.go.jp/drugs/2024/P20240829003/672212000_30600AMX00115_A100_2.pdf. Accessed Jan 30, 2025.
17. Kaplan SL, *et al*. Invasive pneumococcal disease in children's hospitals: 2014-2017. *Pediatrics* 2019;144(3). doi: 10.1542/peds.2019-0567
18. Olarte L, *et al*. Invasive pneumococcal infections in children following transplantation in the pneumococcal conjugate vaccine era. *Transpl Infect Dis* 2017;19(1). doi: 10.1111/tid.12630
19. CDC. ACIP Updates: Recommendations for the Use of 20-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine in Children – United States, 2023.
<https://stacks.cdc.gov/view/cdc/133252>. Accessed Jan 31, 2025.
20. 竹下健一, *et al*. ハイリスク小児におけるインフルエンザ菌 b 型ワクチン、肺炎球菌ワクチン接種状況に関するアンケート. *小児感染免疫* 2018;30(1):57-62. doi:

おわりに

肺炎球菌性肺炎や IPD のリスクとなる主な基礎疾患ごとに、6 歳～64 歳のハイリスク者に対する肺炎球菌ワクチンの予防効果と推奨の要点を記載した。この他に、神経筋疾患や脳卒中などの神経系疾患でも肺炎球菌感染症が起こりやすいことが海外から報告されており¹⁾、わが国の 6～64 歳の IPD の基礎疾患の検討でも明らかになっている²⁾。ここに記載した基礎疾患以外でも、患者ごとに肺炎球菌感染症のリスクを評価し、3 種類の肺炎球菌ワクチンの適応を検討することが望まれる。

任意接種である 6 歳から 64 歳までの肺炎球菌ワクチンの適応は、基礎疾患の種類、その重症度、生活環境、患者の価値観などによって異なるため、臨床的共有意思決定 (shared clinical decision making)^{3, 4)}の考え方に基づいて、患者・保護者と医師のあいだで双方向的・相互作用的に検討する必要がある。今回の「考え方 第 3 版」がその際の参考になれば幸いである。

引用文献

1. Shea KM, *et al*. Rates of pneumococcal disease in adults with chronic medical conditions. *Open Forum Infect Dis* 2014;1(1):ofu024. doi: 10.1093/ofid/ofu024
2. Hanada S, *et al*. Multiple comorbidities increase the risk of death from invasive pneumococcal disease under the age of 65 years. *J Infect Chemother* 2021;27(9):1311-1318. doi: 10.1016/j.jiac.2021.04.018
3. Kobayashi M, *et al*. Pneumococcal vaccine for adults aged \geq 19 years: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices, United States, 2023. *MMWR Recomm Rep* 2023;72(3):1-39. doi: 10.15585/mmwr.rr7203a1
4. 藤本修平,他. 共有意思決定<Shared decision making>とは何か? インフォームドコンセントとの相違. *日本医事新報* 2016(4825):20-22

2025年4月9日

日本呼吸器学会感染症・結核学術部会ワクチン WG／日本感染症学会ワクチン委員会／日本ワクチン学会・合同委員会

日本呼吸器学会感染症・結核学術部会ワクチン WG

荒川 悠、大石和徳*、倉井大輔、高橋 洋、永井英明、中村茂樹、長谷川直樹、丸山貴也、
迎 寛、山本和子

*委員長

日本感染症学会ワクチン委員会

岩田 敏、大石和徳、岡田賢治、神谷 元、川名 敬、関 雅文、多屋馨子、永井英明、
中野貴司、西 順一郎*、宮下修行

*委員長

日本ワクチン学会 理事長 中野貴司

執筆協力者

石和田稔彦、沖中敬二、筒井裕之

他学会による査読

日本循環器学会（桑原宏一郎）、日本腎臓学会（斎藤知栄、戸田 晋）、
日本肝臓学会（四柳 宏）、日本糖尿病学会（戸邊一之）、日本リウマチ学会（奥 健志）